LA MENSAJERA BELGA Y SU TRATAMIENTO PRÁCTICO

Autor - Louis Vermeijen – Amberes - 1937
Traducción del inglés - Néstor Diego

PREFACIO

Es con gran placer que ofrezco esta edición de mi libro a los aficionados ingleses y americanos. Espero que esta edición tenga el mismo éxito que disfrutó el libro original. Para el principiante será una guía segura: le enseñará a conocer sus palomas y a darle más importancia a la práctica que a la teoría. Para el aficionado experimentado su mensaje es: «más de un camino conduce al éxito».

EL PALOMAR

El sitio

Para los que tienen un buen terreno lo ideal sería un palomar de jardín; las palomas vivirían, por así decirlo, al aire libre. Estaría construido a cierta altura del suelo; la circulación del aire por debajo obviará la humedad en gran medida. Prefiero que el piso este a 6' (1,80m) metros del suelo para tener un pequeño lugar como almacenamiento para las cestas, el grano, etc; o incluso como un palomar extra, o como un hospital para palomas enfermas. En la construcción del palomar de jardín se tomarían precauciones contra los gatos de los vecinos, y las ratas y ratones que vienen a robar si el grano se descuida. Los que permiten a sus palomas estar libres en el jardín les impedirían que vagabundeen demasiado. Mi experiencia es que las palomas se enferman con sustancias que picotean en la tierra, especialmente en los pequeños jardines de la ciudad; por ejemplo, plantas venenosas como las enredaderas e hiedras silvestres; o ciertas clases de mohos que crecen en la humedad de las piedras; pero más especialmente los excrementos de los gusanos: a las palomas les gusta mucho a pesar de que es perjudicial; las palomas que ingieren estos excrementos rápidamente pierden la forma. La ventaja más grande de un palomar de jardín es que el aficionado siempre está cerca de él y a la vista de sus aves, y estas llegan a conocerlo. En la mayoría de los casos, no obstante, la necesidad obliga al aficionado a mantener sus palomas bajo el tejado de la casa (en la buhardilla), lo cual sin embargo no les impide ganar tantos premios como los que tienen la ventaja del jardín. De hecho, los que usan la buhardilla pueden fácilmente convertirla en una especie de palomar de jardín: solo es necesario dejar el frente abierto, cuidando de tener un cierre para usar cuando el tiempo es malo.

La orientación

Debe tenerse cuidado en orientar la apertura del palomar hacia el sureste (SE). De esta dirección no hay peligro de vientos húmedos. Los rayos del sol entran pronto por la mañana, lo cual es un gran factor para la salud de las palomas. No obstante, no es una regla absoluta que la entrada deba mirar hacia el sureste. En un tiempo nosotros mismos teníamos nuestro palomar abierto hacia el oeste (O), lo cual no nos impidió ser campeones de nuestra Sociedad. Uno de nuestros amigos además tenía el suyo abierto al norte (N), y sus palomas eran imbatibles en todas las distancias. Sin embargo, cuando pueda, siempre elija el sureste (SE) ya que esto es lo mejor.



Sobre todo la entrada nunca debería estar en la dirección en la que viene el viento húmedo; la humedad es una causa segura de fracaso; las palomas al instante pierden la forma, y están sujetas a toda clase de enfermedades, entre otras el catarro y el mal del ala. Si las circunstancias impiden construir el palomar como uno desea ciertas precauciones han de tomarse en orden a que las palomas no queden expuestas al viento húmedo. El anterior dibujo muestra una buena solución para proteger el palomar contra el viento perjudicial: (a-b) es un cristal que protege del viento a las palomas que están dentro. Con unas pocas claraboyas, o tejas de cristal, puede obtenerse toda la luz deseada.

Iluminación y ventilación

El palomar debe ser luminoso. Es un hecho establecido que la luz tiene un efecto saludable en el desarrollo de los seres vivos. Entre más luz haya, menos problemas en cuanto a insectos y parásitos. Los rayos del sol son el mejor remedio contra toda clase de microbios. Por esta razón, es muy deseable construir el palomar para que los vivificantes rayos del sol puedan entrar libremente. La iluminación del palomar no presenta ninguna dificultad: unas pocas claraboyas o tejas de cristal son suficiente. La mejor solución es poner una o dos claraboyas que puedan abrirse cuando se desee. Sin embargo, tenga cuidado de que las ventanas no vuelvan su palomar un invernadero: sería demasiado caliente en el verano. No olvide que el calor sofocante es causa de mucho fracaso. Por este motivo debe cuidar la ventilación. Las palomas nunca pueden tener demasiado aire. Entre más fresco el aire que respiran, más capaces de resistir las enfermedades debido a que su sangre es más rica. ¿No favorece el aire puro el desarrollo de glóbulos rojos, incrementa su número, y así contrarresta las dañinas actividades de los microbios? Para que entre abundante aire puro, y también para deshacerse del aire viciado, se necesita una buena ventilación. Esto puede lograrse con chimeneas pequeñas, o simplemente con tejas acanaladas. No hay que temer una ligera corriente de aire, siempre que las palomas estén fuera de ella. El mejor material para el techo son las tejas que no absorben la humedad. Las planchas de zinc vuelven el palomar demasiado caliente, a menos que se pongan agujeros de ventilación. Es aconsejable dejar las te-

jas sueltas, y colocar entre ellas pequeños trozos de madera en verano; de esta manera se aumenta la ventilación; en efecto, es el mejor sistema que conozco. En ocasiones he visto palomares donde el aire entraba entre cada teja; se podía ver a través del techo, pero las palomas brillaban con salud y fuerza, y traían a casa muchos primeros premios. Prefiero más estos humildes palomares que los más pretenciosos cuyos techos son herméticos y no permiten la ventilación. La falta de ventilación siempre es la causa del aire viciado, de ahí el catarro al interferir con los órganos respiratorios, la debilidad e incluso la intoxicación.

La construcción externa del palomar

La entrada y la tabla de aterrizaje se sitúan entonces, siempre que sea posible, mirando al sureste (SE). No me gusta poner la entrada justo a nivel del suelo, ya que en este caso uno tiene que agacharse para coger la paloma cuando regresa del concurso. Es mejor permanecer erguido para atraparla. La mejor posición para la entrada, en mi opinión, es en el frente del palomar (A), a un metro del techo (del canalón de desagüe). Es sorprendente lo fácil que entran las palomas con la colocación de la entrada descrita aquí. Cuando aterrizan se encuentran de cara la pared y el tejado, lo cual les impide elevarse otra vez y volar alrededor de la casa. Más o menos puede obtenerse el mismo resultado colocando la tabla de aterrizaje a la altura del canalón de desagüe (B). No obstante, si la apertura se coloca demasiado alta (C), digamos cerca de la cumbre del tejado, resulta demasiado fácil para las palomas volar otra vez en lugar de aterrizar y entrar. ¿Es necesaria una tabla de aterrizaje? Puede obviarse fácilmente: una simple abertura en la pared es suficiente; a través de esta abertura (ventana) las palomas entran en el palomar; para que no puedan escapar cuando se las va a coger puede colocarse una cortina o una puerta. Yo prefiero, no obstante, una plancha de aterrizaje bastante amplia, incluso si solo es para que los pichones puedan tener una buena vista de los alrededores. Para que las palomas no pierdan el tiempo, o caigan dentro de las chimeneas, estas se cubren con tela metálica. Tenga cuidado de que sus palomas no se envenenen en el canalón de desagüe. Estos deben estar bien limpios y tapados para impedir que beban en ellos.



El palomar de Jardín



(A) Interior.

(a-b) Tela metálica para que el aire pueda pasar fácilmente.

(c-d) Plancha de alimentación en la que se esparcen los granos, y en la cual la paloma es cogida al regreso del concurso.

(e-f) Plancha de aterrizaje.

(g-f) Entrada de las palomas.

(g-h) Ventana de cristal, que puede abrirse para que entre el sol libremente.

(i) Chimenea de ventilación.

Las palomas aterrizan en la plancha de aterrizaje, pasan a través de la entrada, y caen sobre la plataforma de alimentación. La gran ventaja de este sistema es la siguiente: las palomas están acostumbradas a encontrar el alimento en esta plancha al mismo tiempo que su dueño esta frente a la entrada, en consecuencia, no necesita esconderse. Cuando las palomas regresan del concurso ven a sus compañeras en la plancha de alimentación picoteando unos pocos granos que han sido puestos ahí. Esta escena familiar induce a la paloma a entrar inmediatamente; cae en el medio del grupo, y entonces puede cogerse sin asustarla. Su entrada puede facilitarse redondeando el borde interior de la tabla con una pieza de zinc.



La entrada puede hacerse simplemente con tablillas de madera separadas entre sí 4" (10 cms): si se usa este tipo de entrada, es necesario que este a 10" (25 cms) de alto sobre la plancha de alimentación, para que las palomas no puedan salir a través de las tablillas.



Un buen sistema es el siguiente: hay dos puertas de entrada (a-b) (c-d) que pueden ser abiertas con un hilo. (a-b) se abre y (c-d) se cierra para que la paloma entre, entonces (a-b) se cierra y (c-d) se abre. Las palomas entran, por tanto, sin tener que pasar ningún obstáculo. Las palomas enseguida se acostumbran a esta maniobra. Si dudan en entrar, pueden ser cogidas, ya que no pueden escapar, habiendo cerrado silenciosamente la entrada (a-b) detrás de ellas.



Es aconsejable acostumbrar a las palomas a salir del palomar a través de otra abertura distinta a la de entrada. La salida puede hacerse sobre la entrada, o simplemente a través de un agujero en la pared donde está la entrada.



Un extremo de la plataforma de aterrizaje se reserva para un pequeño soleadero de varillas o barrotes, que sirve como reconocedor cuando se aquerencian palomas a un nuevo palomar. A las palomas a aquerenciar se les permite entrar libremente y acostumbrarse a su nueva vivienda antes de ser soltadas. Es inteligente poner un timbre en la entrada para avisar al aficionado de la llegada de sus palomas: para entrar, la paloma debe pasar sobre la tabla (a) que presiona el timbre (b) con su peso y lo hace sonar.



El interior del palomar

Ya he mencionado la plataforma de alimentación. Esta sería suficientemente amplia para que la mayoría de las palomas se alimenten allí. También se necesita un bebedero. La vista del bebedero las induce a entrar más rápidamente ya que después del concurso casi siempre están muy sedientas. Esta tabla de alimentación se coloca para que uno pueda estar de pie y recto cuando las alimenta o cuando las atrapa. Estaría a 25 cms por debajo de la entrada y tendría un buen tamaño para que las palomas que entran salten sobre ella. Una paloma que no ve un lugar cómodo donde saltar permanece en la entrada.

Los criaderos

Su construcción y tamaño dependen del espacio disponible. Sin embargo, es aconsejable hacerlos de las medidas siguientes:



Fig 1: (A-B) Tabla de reposo de 25 cms de ancho. (C-D) Tabla divisoria de 25 cms de ancho. Aconsejo, por tanto, que sean bastante grandes. Me gusta que las palomas tengan bastante espacio en su criadero, especialmente durante la época de acoplamiento. Muchos huevos infértiles se deben a que las palomas no tienen suficiente espacio para mover las alas en su criadero. La altura dada es para colocar una tabla a 25 cms de altura sobre la cual el macho pueda reposar por la noche. Una partición se coloca en el centro del criadero para dividirlo en dos nidales iguales; esta es una precaución útil para impedir que los pichones vayan al nido donde sus padres incuban los huevos.



Fig 2: (A-B) Tabla a media altura de 25 cms de ancho. (E-F) Pequeña puerta abatible de 25 por 25 cms delante del criadero que la paloma usa para entrar.



Fig 3: El frente del criadero se cierra con una puerta de barrotes verticales en la cual hay una entrada de 25 x 25 cms. Esta pequeña entrada se cierra con una puerta oscilante (que sirve como posadero frente a la entrada). La puerta del criadero. (A-B-C-D) puede cerrarse a voluntad. Los barrotes verticales están bastante juntos para que las palomas no asomen la cabeza a través de ellos.



Fig 4: A algunas palomas les gusta hacer su nido en rincones oscuros. Para tenerlas contentas la puerta frontal del criadero puede hacerse mitad de madera y mitad de barrotes.



Fig 5: El siguiente tipo de criadero, frecuentemente visto, es igualmente recomendable: 60 x 30 x 30 cms. Cada pareja tiene de este modo dos compartimentos de 30 x 30 cms separados por un tabique de madera o de barrotes. Las palomas tienen sus pichones en uno de los compartimientos y en el otro incuban; de esta forma no hay temor de que los pichones rompan los huevos. En cualquier caso, prefiero que la luz no de directamente dentro del criadero. Para ello, recomiendo la siguiente colocación de los criaderos en el palomar.



No conozco mejor sistema que este. El tamaño del pasillo entre los criaderos depende del espacio disponible. No obstante, no sería tan ancho que las palomas puedan volar demasiado. Un palomar demasiado grande produce palomas salvajes. La puerta de entrada para el aficionado esta en el lado opuesto a la tabla de entrada para las palomas. Esto es recomendable aunque solo sea por la ventilación. Con la puerta cerrada no hay corriente.



Es mejor tener dos filas de casilleros (y tres de criaderos) en cada lado; eso da una altura de 150 cms. Contando que la distancia del piso a la primera fila de criaderos es de 30 cms, la altura total es de cómo mínimo 180 cms. Esta es la altura más deseable para un palomar, a menos que el aficionado mida más de 180 cms. No permita a las palomas anidar sobre el piso, es muy torpe; el aficionado tiene que agacharse para coger las palomas, y sería muy fácil para los pichones salir del nido y perseguir a sus padres. El punto más importante es que las palomas tengan abundante aire puro en el palomar. Poner 30 parejas donde solo hay espacio para 20 es un proceder muy desaconsejable, en efecto, la masificación es una causa segura de fracaso. Si los criaderos se hacen de las medidas citadas: (70 x 50) x 60 cms, con una tabla de reposo dentro, no hay necesidad de poner posaderos individuales. Si son más pequeños: 60 x 30 x 30 cms, se necesita que los machos tengan un lugar donde reposar por la noche: pequeños casilleros de: 30 x 30 x 30 cms; o en su defecto, posaderos o palitos de 15 cms de largo y de 5 a 10 de ancho, cuidando que las palomas no puedan ensuciar a las que están debajo. Si se ponen palitos, estos deberían ser bastante anchos, mínimo 5 cms, para dar un buen soporte; las palomas deben ser capaces de mantener el equilibrio fácilmente. Los bordes de los palitos deben redondearse. Cualquiera que sea el tipo de palomar elegido, es necesario que no solo las palomas estén cómodas, sino también que el aficionado sea capaz de trabajar con facilidad durante el tiempo que este atendiendo a sus palomas. Siempre hemos encontrado aconsejable tener varios criaderos tipo kotje bastante grandes para mantener una pareja de palomas. Estos son simples criaderos que en lugar de estar colocados como los otros, tienen su entrada dando directamente a la plataforma de aterrizaje; las palomas aterrizan sobre la tabla y van directamente a su criadero, donde encuentran la comida y la bebida. Una teja con agujero puede servir como entrada. Este sistema se recomienda especialmente para los aficionados especialistas en los concursos de velocidad.

El palomar de los pichones

Los antiguos aficionados preferían dejar los pichones en el mismo palomar con sus padres, es lo más natural. No obstante esto, es una gran ventaja separar los pichones de sus padres cuando tienen veinticinco días de edad, y ponerlos en un palomar especial. Este no necesita criaderos, pero debería tener casilleros, o posaderos individuales de madera, que sirvan como lugar de reposo para los pichones. Tener un palomar especial para pichones, hace más fácil enseñarles el hábito de entrar enseguida. Lo cual, de hecho, es de la mayor importancia en tiempo de concursos. También elimina la posibilidad de que los pichones sean perseguidos por las palomas adultas. Si, no obstante, no se puede tener uno, el palomar debe tener suficientes casilleros para que los pichones tengan lugares donde reposar.

El sistema ideal

A toda costa, el palomar debe construirse de manera que los machos y hembras se puedan separar durante Diciembre y Enero. Estarían separados de tal forma que machos y hembras no puedan verse entre sí. El siguiente plano muestra el sistema ideal.



(A-C) puertas correderas. (E-E) Plataformas de entrada (se pueden unir para formar una sola). Entre (B-D) se puede colocar un cristal azul para poder observar a las palomas sin molestarlas. No es aconsejable que las palomas estén muy cerca del techo. Es demasiado caliente, o demasiado frío, o demasiado húmedo (cuando hay tejas defectuosas). Es mucho mejor hacer el techo bastante alto para dejar un espacio entre él y las palomas, cerrado por barrotes o rejilla. Esto favorece la salud de las palomas. El aire viciado y maloliente se acumula cerca del techo, y de este modo es perjudicial permitir que las palomas ocupen ese espacio. Tal disposición como la he descrito incrementa al mismo tiempo el tamaño del palomar, y da un mayor volumen de aire para las palomas. No debe olvidarse tener un lugar aparte para las palomas enfermas. Unos pocos casetones en un lugar seco, bien ventilado, y donde el sol pueda darles. Para evitar contagios, este “Hospital” no estaría en contacto directo con el resto del palomar.

-

LA ALIMENTACIÓN

Las palomas viven principalmente de granos. Les gustan ciertas plantas, cultivadas o salvajes. En los campos encuentran babosas, bellotas, y pequeños guijarros. Su alimento es ablandado y predigerido en el buche. No está bien establecido qué papel juegan los pequeños guijarros que engullen las palomas. Durante mucho tiempo se suponía que hacían de dientes para masticar el grano. Probablemente ayudan a ese fin. Se ha demostrado, no obstante, que los pequeños guijarros, la arcilla, las piedrecillas, y toda clase de cosas que ingieren las palomas, son atacadas por los jugos gástricos secretados por los órganos y glándulas de las aves, y ciertas sustancias son extraídas en el proceso, las cuales son útiles para el buen funcionamiento del organismo de la paloma. Los principales elementos o nutrientes son: (1) Albúmina o proteína y (2) Carbohidratos y Grasas. Las investigaciones científicas parecen demostrar que la albúmina tiene una gran influencia en la formación y renovación de los tejidos, el plumaje, y las partes duras, tales como el pico y las uñas. La sustancia albuminoidea da calor como también lo hacen las grasas, mientras que los carbohidratos dan fuerza y actividad. El exceso de carbohidratos es almacenado por el cuerpo como reserva. El oxigeno tomado por la sangre durante la respiración, entra en contacto con los carbohidratos y las grasas, produciendo energía. Al mismo tiempo se forma anhídrido carbónico y agua, los cuales son eliminados a través de los pulmones y otros órganos. La acción del oxigeno sobre la albúmina produce calor y actividad, ya que el anhídrido carbónico se convierte en agua y ácido úrico. Si se dan demasiadas leguminosas (feveroles, guisantes, vezas) también se produce demasiado ácido úrico por el organismo de la paloma para poder eliminarlo rápidamente, esto es la causa de la temida enfermedad del ala. Muchos escritores han usado estos hechos científicos para demostrar la necesidad de que el alimento lleve ciertas proporciones de albúmina, carbohidratos y grasas. Después de analizar los diferentes granos han establecido que este y ese grano se debe incluir, y otros excluir. La experiencia, no obstante, muestra que muchos aficionados han obtenido excelentes resultados usando solo feveroles (leguminosas: exceso de albúmina), mientras que otros han puesto su fe en el maíz (cereales: exceso de carbohidratos y grasas), y a pesar de ello han triunfado ganando carreras en todas las distancias. Todo esto prueba que en la colombofilia uno no debe ser demasiado dogmático. El éxito es lo que cuenta, la teoría es secundaria. No obstante, estoy lejos de sugerir que la dieta se limite solo a un grano en particular. A continuación doy un esquema de comidas, que he recomendado a muchos aficionados de mi confianza, y puedo decir que, los que lo siguieron, nunca han tenido motivos para lamentarse.

Invierno

25% Feverol Guisante Veza.

25% Maíz.

25% Trigo.

25% Cebada Avena Alforfón Centeno y Linaza.

Esta mezcla contiene suficiente nitrógeno, y es rica en carbohidratos y grasas. Esta calculada para liberar el cuerpo de las toxinas acumuladas durante el periodo de concursos. Una comida al día es suficiente. Sería bueno, no obstante, dar un poco de Linaza por las mañanas, si el tiempo lo permite, un puñado por cada 20 palomas.

Crianza

Una quincena antes de los acoplamientos, se deja a las palomas a dieta un día completo. Al día siguiente, se las purga, solo reciben Linaza por la tarde. El siguiente día se va cambiando poco a poco la mezcla de invierno, hasta llegar a la mezcla siguiente:

45% Feverol Guisante Veza.

35% Maíz.

15% Trigo.

4% Alforfón y Linaza.

1% Postre (Cebada pelada Arroz Mijo Alpiste y Pan (pero muy poco)).

Esta mezcla está calculada para que las palomas críen buenos pichones, y para ponerlas en forma para los concursos. Dos comidas al día.

Viajes

La crianza ahora no es lo más importante. Tan pronto se destetan los pichones las palomas comienzan a entrenarse.

30% Feverol.

15% Veza.

5% Guisante.

40% Maíz.

5% Trigo.

5% Postre.

Tres comidas al día (6am, 12am, 5pm) o dos comidas al día (8am, 4pm). Es aconsejable dar el postre como sigue: 2% en Abril y Mayo, aumentando gradualmente hasta el 5% en Junio. En Julio y Agosto, en adición al Postre, se les da también un poco de Cañamón a las palomas que siguen viajando.

Muda

Desde Agosto en adelante. Dos comidas al día.

35% Feverol Guisante Veza.

40% Maíz.

20% Trigo.

5% Postre.

Observaciones sobre la alimentación

Las proporciones dadas sobre los diferentes granos son solo una indicación, el porcentaje no sería tomado demasiado literalmente. Si está satisfecho con su actual sistema de alimentación, no se apresure a cambiarlo. El aficionado debe encontrar la mezcla que más les conviene a sus palomas. La que es buena para una raza de palomas, puede no serlo para otra. Algunas razas lo hacen bien con abundancia de Maíz, mientras que otras requieren más Feveroles para dar su máximo. Algunas palomas necesitan semillas estimulantes como el Cañamón, mientras que otras pueden pasar sin ellas. El aficionado no debe imitar ni copiar a

otros, más bien debe investigar y descubrir lo que le conviene a su caso en particular. Comenzando con la mezcla que le he dado, puede aumentar o disminuir la proporción de Maíz o de Feveroles.

Evite los cambios bruscos

Emplee dos o tres semanas en pasar de una comida a otra, no cambie repentinamente, nada es más dañino. Con frecuencia ha sido mi experiencia que un súbito cambio en el régimen alimenticio ha tenido el efecto inmediato de trastornar la salud de las palomas. La temida complicación en algunos casos ocurrió después de darles una clase de grano diferente. No hay peligro si el cambio se hace gradualmente. Antes de que se agote su vieja comida, haga una nueva compra, y sirva simultáneamente la comida vieja y la nueva, muy poco al principio, luego aumente la proporción según se acabe la comida vieja. De esta forma el cambio a la comida nueva dura de dos a tres semanas. Lo anterior es de la máxima importancia durante la estación deportiva. Muchas palomas, en el medio de su éxito, han repentinamente fracasado solamente a causa de un súbito cambio en la comida. Un repentino cambio de esta clase puede causar que una paloma pierda su gran forma de un día para otro. Esta es la razón por la que es tan importante tener la comida correcta desde Febrero hasta Septiembre.

El grano debe estar sano

Nunca compre grano malo, o grano mal almacenado. Para estar seguro debe elegir a un suministrador de confianza. Mantenga su grano en un lugar bien ventilado. Lo ideal es un recipiente con fondo de rejilla, para cernir y ventilar el grano evitando que se estropee. Protéjalo de gatos, ratas, y ratones. No imagine que el grano debe tener dos o tres años para ser bueno. No tenga miedo de dar grano nuevo al final de Mayo o comienzo de Junio. Es un error pensar que el grano viejo es mejor, al contrario, el grano de la última cosecha es más rico en vitaminas, y por consiguiente mejor para las palomas. Se dice que el grano recién cosechado produce diarrea. No hay mucho peligro de esto, se puede evitar fácilmente si el grano nuevo se da en pequeñas cantidades. En tiempo de muda, en Agosto, es incluso ventajoso dar a las palomas un poco de trigo duro recién cosechado.

Método para alimentar a las palomas

Hay aficionados que compiten bastante bien sin cuidar de sus palomas, y menos de la comida que les dan. A ratos perdidos, cuando tienen poco que hacer, se acuerdan de alimentar a sus palomas. Normalmente dan más cantidad de granos del que las palomas pueden comer en el momento, piensan que el sobrante será comido más tarde. No se preocupan de si el grano se ensucia con los excrementos, o si el agua se llena de estiércol. Ganan premios, por tanto su sistema debe ser correcto. Ya he mencionado que hay más de un camino para tener éxito. Mi experiencia, no obstante, es que muchos aficionados deben su fracaso a su método, o a su falta de método. Tal abandono no los excluye absoluta y generalmente de ganar premios, sin embargo, es la causa directa del fracaso. Además, las palomas mal cuidadas, alimentadas con granos sucios, y alojadas en palomares insanos, más pronto o más tarde sufren epidemias; todas las palomas se verán más o menos afectadas. Entonces será demasiado tarde para hacer algo por ellas, y las palomas quedarán inútiles como viajeras o como reproductoras. Si un aficionado no tiene suficiente tiempo para atender apropiadamente a

sus palomas, porque sale de casa pronto por la mañana y no regresa sino al final del día, todavía puede superar la dificultad dejando bastante comida en un comedero construido para que las palomas se alimenten sin ensuciar los granos. Tales comederos (tolvas) pueden comprarse en las tiendas especializadas. Para los que prefieren construirlos ellos mismos, el siguiente dibujo les será útil: Tolva (comedero) vista en sección y de frente.



(A) Depósito para el grano.

(B) Lugar donde comen las palomas.

(o) Abertura por donde sale el grano de A a B.

(b-d) Barrotes a través de los cuales comen las palomas.

(d-c) Tabla de 5 centímetros de altura.

El comedero se llena con Guisante y Maíz; cuando regresa el aficionado por la tarde, el mismo les da con la mano las semillas pequeñas; esta alimentación con la mano vuelve mansas a las palomas. Los que se especializan en las distancias más largas encuentran especialmente bueno este sistema. No obstante, el sistema tiene su desventaja, el exceso de comida no solo las vuelve demasiado gordas para ganar concursos, sino que también las vuelve propensas a sufrir enfermedades. He conocido varios casos en que los aficionados que dejaban que sus palomas comiesen todo lo que querían estas no trabajaban bien, y han vuelto a su vena ganadora como resultado de seguir mi consejo, y modificar su método de alimentación. El método recomendado por mi tiene la finalidad de mantener las palomas en buena condición, y en buena forma para viajar. Las palomas entran rápidamente, y se mantienen en buena salud. El método es sano y seguro.

La mejor forma de alimentar a las palomas

El alimento no se daría todo junto, sino puñado a puñado, y esparcido frente al cuidador, para obligar a las palomas a estar cerca de él. Al principio, algunas palomas se mantienen alejadas; estas, las más salvajes y temerosas, no reciben comida. No obstante, el hambre

pronto las amansa, y después de dos o tres días, todas vienen a comer de la mano. Háblelas a sus palomas mientras comen. Acostumbrelas a ser cogidas en la mano. Esta es la mejor preparación para que viajen y entren rápidamente. Sirva la comida puñado a puñado hasta que vea que es suficiente. Un aficionado observador puede decir cuando han comido todo lo que necesitan. Una buena regla general es la siguiente: 'cuando dos o tres palomas dejan de comer, y van a beber, deje de servir comida'. Las otras palomas se comerán el grano que todavía queda en la tabla de alimentación. Las palomas de este modo no tienen nada entre comidas. "No se les da de comer antes de salir". Las palomas salen del palomar con toda clase de tiempo (excepto cuando nieva o hay neblina), y durante su ausencia, el palomar se limpia, y el agua de beber se cambia. Después de media hora o así, se llama a las palomas, ellas enseguida aprenden a entrar a la primera llamada. Las que no lo hacen, se quedan sin comer hasta la próxima comida, lo cual les sirve de lección. "Este sistema no se cambia cuando las palomas están criando". No imagine que por poner un comedero pequeño con Feveroles en el criadero los pichones crecen más, o más rápido. Los que siguen este método, lo encuentran rentable, y no quieren cambiarlo.

-

LAS PALOMAS

Las características de una buena paloma

Es fácil enumerar un montón de cualidades que debe poseer una paloma para ser clasificada como buena, incluso se ha hecho un prototipo estándar. Sin embargo, muchas palomas que no poseen todas esas buenas cualidades, e incluso parecen tener muchos defectos, triunfan ganando premios, y se convierten en excelentes reproductoras. Las siguientes líneas se dan como una guía, con la advertencia de que hay excepciones para toda regla.

La cabeza

Sería de forma convexa, bien desarrollada, a menudo ligeramente plana en lo alto, en las palomas de gran clase. La frente amplia entre los ojos, incluso protuberante. Ciertos expertos dicen que justo aquí está situado el bulbo de la orientación. La cabeza sería alta. El bulbo de la resistencia estaría en la parte trasera. Aunque hay buenos machos con cabezas pequeñas, es preferible no confiar mucho en palomas con esta peculiaridad, cuyo pico está demasiado cerca de los ojos. Normalmente tales palomas no son inteligentes. Además, no se puede esperar mucho de palomas cuyos ojos están muy juntos.

El pico

Sería de aspecto sólido, y bien plantado en la cabeza. Su tamaño estaría en proporción con el resto del cuerpo, su forma no tiene importancia, puede ser largo y fino, o corto y grueso. Ni tiene el color del pico relación con la calidad del ave, ya que esto depende de la crianza de la paloma. Hay aficionados a los que no les gusta el color claro, casi blanco, pero no obstante, muchas palomas buenas tienen esta característica; por otra parte, las demás palomas tienen el pico negro, especialmente cuando cuentan pocas semanas de edad. Esto es un signo de la raza, como lo son las patas negras. No se deduce que lo uno u otro sea un signo de superioridad. Picos claros o parcialmente claros van con las palomas de plumaje blanco o pinto. La mandíbula superior sería más grande que la inferior.

El cuerpo

Sería una estructura sólida; una paloma de estructura ligera no es muy buena, a menos que esa paloma en particular este en mala condición. Ni, por otra parte, tendría cuerpo de gallina (pesado). El cuerpo debe sentirse duro; la carne no está fofa al tacto, sino firme como el hierro por así decirlo. La espalda ancha, con hombros poderosos. El pecho amplio, con abundante espacio para pulmones bien desarrollados. La rabadilla, espesamente cubierta de plumas.

El esternón

No olvide que los músculos de las alas están unidos al esternón; si el esternón no es fuerte y bien formado, el vuelo de la paloma sufrirá. Sería fuerte y grueso para aguantar los diversos músculos. Las palomas con un esternón desviado, deberían eliminarse. No sería ni curvo ni plano, sino ligeramente arqueado, más en el pecho que hacia la cola, para facilitar el vuelo del ave.

Un esternón plano es un defecto malo, pero una ligera desviación de lo normal no afecta al vuelo del ave, a menos que la desviación sea efecto de una debilidad constitucional de la paloma, aunque no obstante, las palomas débiles se detectan pronto.

Las alas

Según la raza de la paloma, tendrá alas redondas o angulosas. Las campeonas se encuentran en ambas clases. Es valioso notar que las aves veloces, como el martinete, tienen alas muy angulosas. Algunas palomas extienden sus alas a la menor tracción con los dedos, la dan fácilmente; mientras que otras las mantienen pegadas al cuerpo. Es difícil extender las alas de estas últimas. No obstante, hay algunas buenas entre estas, especialmente para volar contra el viento. Prefiero la paloma cuyas alas son fáciles de abrir. El ala estaría curvada hacia abajo, con primarias anchas, y sin huecos entre ellas. El ala secundaria o tras ala, estaría especialmente bien desarrollada. Las primarias tendrían mucha fuerza de resistencia debido a su flexibilidad. Las pequeñas plumas que cubren las alas contribuyen grandemente a esa resistencia. Entre mayores y más fuertes sean las coberteras, más eficientes serán las alas. No es esencial que las alas cubran completamente la rabadilla; por el contrario, hay buenas palomas cuyas alas dejan descubierta la espalda. El final del ala estaría tan cerca como sea posible del final de la cola, especialmente en las esprinters. Le doy gran importancia a la longitud de la última primaria (la décima); sería al menos tan larga como la novena, o más larga todavía. El brazo sería fuerte, especialmente en las reproductoras, no obstante, sería flexible.

El plumaje

El color no tiene relación con la calidad de la paloma. Sin embargo, es una indicación en ciertas razas. Yo tenía por ejemplo una pareja, un macho azul pinto y una hembra roja; de ellos tuve buenos pichones, rodados, rojos, y pintos; los rodados resultaron ser los mejores. Se debe dar la preferencia a las palomas cuyas plumas tienen tallos suaves y flexibles. Las plumas duras son un defecto, especialmente durante el tiempo lluvioso. Los tallos rajados no son un hándicap para que la paloma compita; hay muchos ejemplos de aves con esta peculiaridad que ganan carreras año tras año, y algunas veces con mal tiempo. No se conoce la causa de los tallos rajados; algunos dicen que es debido a los parásitos, otros que se debe a la falta de sustancias minerales en la comida, o al mal funcionamiento de las glándulas que las nutren. Cualquiera que sea la causa, no hay necesidad de preocuparse, ya que no influye perceptiblemente en el vuelo. Sin embargo, no sería inteligente criar con dos palomas con este defecto. Esta peculiaridad puede eliminarse por selección.

La cola

La cola de una buena paloma normalmente es esbelta y no demasiado larga. Cuando el ave está en reposo, la cola tiene la anchura de una sola pluma. No obstante, puedo dar ejemplos de excelentes palomas con colas grandes, como mi famosa “The Tail” de 1913.

Las patas

Estarían sólidamente construidas, y serían nerviosas. La limpieza de las patas es un signo de buena salud. Incluso si la paloma está un poco fuera de forma, el color de sus pata refleja el hecho; solo las palomas enfermas dejan que sus patas se ensucien. En ciertas razas, los pichones tienen patas negras. Esto es un signo de la raza, pero lo contrario no está reñido con la buena clase. Sin embargo, las palomas zancudas, con pocas excepciones, no resultan ser buenas. A muchos aficionados les disgustan las palomas con uñas grandes, pero entre mis mejores aves habían algunas con uñas extraordinariamente largas, por ejemplo mi "Old Blue" de 1904, y mi "Dreamster" de 1919.

Los ojos

Solo tratare las partes del ojo que son de interés: la Esclerótica, el Iris, y la pupila (circulo de correlación).

La esclerótica

Aunque he conocido palomas con la esclerótica parcialmente cubierta que han ganado carreras en contra del viento, recomiendo que se le dé la preferencia a las que tienen los ojos normales; es decir, con la esclerótica lo más cubierta posible. Este ideal se puede obtener por la cuidadosa selección de los padres.

El iris

Es de gran importancia. Muchos grandes criadores creen que pueden calibrar el valor de las palomas por el color del iris. Permítame decir, sin embargo, que el color de los ojos no tiene nada que ver con el valor de la paloma, en cuanto a las competiciones. Puede ser amarillo, naranja, rojo, marrón, o blanco. Entre todos estos colores, encontramos palomas famosas, tanto viajeras como reproductoras. Es un error creer que un par de ojos bonitos es indispensable para ser un buen ave. Lo principal es un ojo brillante. El ojo debe brillar a la luz, un signo de salud y fuerza. Muchas palomas tienen el iris monocolor, ya naranja, rojo, o marrón. Este es especialmente el caso de palomas pertenecientes a razas de fondo. Cruzar palomas de ojos blancos ha producido toda una serie de colores: ojos bicolores: blanco-rojo, amarillo-rojo, gris-rojo, etc. Nadie rechazaría una paloma que ha probado su valor trayendo a casa primeros premios, meramente a cuenta del color de sus ojos. Con vistas al futuro de la colonia, y a tener una raza fuerte, los aficionados tendrían cuidado, y criarían de aves con el anillo exterior del iris, más ancho que el anillo interior del iris, el cual rodea la pupila del ojo. Uno vigilaría particularmente la tendencia a la palidez del ojo. Esto es un fallo claro, y una debilidad, causada muchas veces por el exceso de consanguinidad. Ciertas palomas de color pinto tienen ojos negros; algunas veces es fruto del albinismo, pero muchas palomas buenas tienen ojos negros. Mi experiencia es que estas aves son particularmente eficientes, especialmente en tiempo malo. De pasada hay que mencionar que las buenas reproductoras, mayormente tienen ojos de colores vivos y brillantes. El color de los ojos de la paloma no se fija permanentemente hasta el tercer año. Deles la preferencia a aves con ojos de colores bien definidos. Siendo el iris un músculo, puede notarse una continua vibración, ya a la vista aguda, o bajo una lupa. El grado de vibración presente, se corresponde con la sensibilidad a la luz. Las palomas que tienen este músculo en continua vibración, son merecedoras de atención.

La Pupila

Permítanos ahora tocar el famoso 'círculo de correlación'. ¿Qué es este círculo? Está formado por el músculo de la pupila, el cual capacita a la paloma para aumentar o disminuir el tamaño de la abertura de la pupila. Este músculo es casi invisible en ciertas palomas. En otras está fuertemente desarrollado y forma una pequeña banda alrededor de la pupila, más o menos ancha, amarilla, grisácea, verdosa, o negra. La banda rodea completamente el círculo de la pupila, pero a veces solo es visible la parte bajo la pupila. En ocasiones la banda es serrada. Durante mucho tiempo, los expertos calibraron el valor de una paloma por esta banda o músculo de la pupila. Estos expertos la llamaron círculo de correlación, por una supuesta correlación entre ella y el valor del ave. Otros expertos declaran que la teoría del círculo de correlación no tiene valor. La verdad es que este signo tiene significado en el caso de ciertas razas, mientras que en el caso de otras variedades, está desprovisto de significado. Por tanto, asegúrese primero de que en la raza observada el círculo es un signo de calidad; en ese caso, la presencia del signo significa: (1) Si el signo es muy visible, rodea toda la pupila, y está claramente definido: determinación y voluntad por parte del ave. (2) Si el circulo es serrado, el ave probablemente será una buena reproductora. Preste especial atención a esas palomas cuyas pupilas parecen alargarse hacia el pico, esto se ve en aves cuyo círculo de correlación solo es parcialmente visible; es decir, en la parte baja de la pupila. Permítanos señalar de pasada, que el músculo de la pupila se contrae bajo la influencia de la luz, y se dilata en la sombra o en la oscuridad. Entre más rápidamente responde el músculo, mayor es la sensibilidad del ave en general. El círculo de correlación es más evidente en las adultas que en los pichones.

La inteligencia

La fuerza es esencial en una paloma si quiere tener éxito, pero la inteligencia es igualmente necesaria. En mi opinión esta última cualidad es 'sine qua non' de una buena paloma. Ciertos expertos dicen que el instinto de orientación radica entre el pico y los ojos, y que la resistencia es una cualidad de las aves con la trasera de la cabeza fuertemente desarrollada. Por favor, no le dé demasiada importancia a estas cualidades puramente físicas. Permítanos considerar la gran verdad: los ojos son el espejo del alma. Es un don especial ser capaz de ver la inteligencia y el carácter en los ojos. Se hace por intuición, y las razones en las que están basadas las conclusiones son imposibles de definir. No obstante, la facultad mejora con el ejercicio: todo aficionado que quiera, puede más pronto o más tarde, aprender a distinguir una paloma inteligente de otra mediocre. Tomemos cuidadosa nota de la apariencia general de un ave, de sus hábitos peculiares, y de cada una de sus acciones. Es solo por una constante observación que uno puede llegar a conocer realmente a una paloma. Haga un hábito el estudio de la conducta de cada una de sus palomas, en reposo, en el vuelo, en los concursos, en casa, y en el nido.

El sexo

Como regla general, el macho es más grande que la hembra. En una colonia modelo de palomas, es esencial ser capaz de distinguir rápidamente entre los machos y las hembras. El macho tiene el pecho más grande que la hembra. Su cabeza es mayor, sus plumas más amplias, y la expresión de sus ojos más dura. Algunas veces es más difícil distinguir el sexo, especialmente en las palomas jóvenes. No obstante, generalmente se encuentra que los ba-

yos y rojos con pintas negras son machos. Una paloma con plumas pequeñas siempre será una hembra. Además, los jóvenes que se muestran vigorosos y agresivos, atacando a sus compañeros con el pico, con seguridad pueden ser reconocidos como machos. Otra forma de averiguar el sexo es por el ala: abra el ala, el macho tiene primarias más anchas que la hembra, y más puntiagudas. Cuando el ala se abre completamente, las primarias y secundarias forman una línea recta en el macho, y una línea quebrada en la hembra.



-

LA REPRODUCCIÓN

A lo que aspiramos, de hecho, es a que nuestras palomas sean las primeras en los concursos. En consecuencia, las palomas bonitas pero vagas son indeseables. Primero viene el valor deportivo, y después la belleza. Si la paloma combina ambas cualidades, tanto mejor, pero nadie deploraría la falta de belleza en una paloma mientras gane premios en los concursos.

Formando las parejas

El futuro de la colonia depende de esto. Por medio de la selección de los animales domésticos, una infinita variedad puede obtenerse. La variedad de palomas en particular es infinita. Tanto en efecto que es imposible reconocer en cualquier ave domestica el ancestro común de todas las palomas; es decir, la paloma salvaje de las rocas, la Columba Livia. La formación de las parejas ejerce una gran influencia en el valor de la descendencia. Apareando dos palomas finas y largas, inevitablemente se produce progenie de similar tipo. Acoplando dos palomas con colas anchas, uno nunca puede esperar obtener colas estrechas. Debemos recordar guiarnos por estos principios indiscutibles. Todos deseamos palomas físicamente perfectas. El primer punto a observar en la elección de los padres es: coger los que han dado mejores resultados en las carreras. Trate de acoplar las palomas de tal manera que, las virtudes de una puedan compensar los defectos de la otra. Seleccionando con cuidado a los hijos, los fallos pueden eliminarse totalmente después de unos pocos años, y al final obtendremos la clase de palomas que queremos. Una paloma con primarias demasiado estrechas, debería acoplarse con otra que no tiene este fallo. Una paloma con ojos saltones, con otra cuyos ojos están bien protegidos. Una con el pecho estrecho, con otra de pecho ancho, etc. ¡Nunca acople dos palomas que tienen el mismo defecto! Los pichones de dos palomas muy fuertes, generalmente son pichones fuertes. Pero por otra parte, no es cierto que los pichones de dos palomas buenas salgan buenos también. La herencia nos da tantas sorpresas que algunas veces salen pichones que en ningún punto nos recuerdan a sus padres. Si dos palomas buenas siempre dieran pichones buenos, la crianza de palomas sería la cosa más fácil del mundo. Solo necesitaríamos comprar las mejores palomas, y criar con ellas, para ganar todos los primeros premios. Los que tienen más dinero tendrían los mejores palomares. Felizmente no es así. ¡Las mejores viajeras no siempre son las mejores reproductoras! Es esencial que las dos palomas tengan afinidad entre sí para criar buenos pichones. Su objetivo es descubrir a las buenas reproductoras, ellas valen su peso en oro. Trate de encontrar si las palomas que se propone acoplar tienen mutua afinidad. No espere obtener resultados al instante, la paciencia y la perseverancia son necesarias en la crianza de palomas. Aplique este método de compensación, y evite acoplar palomas demasiado divergentes. No acople un macho grande con una hembra pequeña, ni una paloma pesada con una ligera. Acople palomas con pequeñas diferencias. No intente alcanzar su objetivo con demasiada prisa, la naturaleza insiste en una progresión gradual. Sobre todo limítese a un tipo de paloma. Elija el tipo que más le guste, manténgalo, y no introduzca otro tipo de paloma. Por limitarse usted mismo a un tipo solo, tiene más posibilidades de triunfar, por ello será capaz de reconocer ciertos signos que distinguen a las palomas de calidad.

La herencia

Todas las leyes, posibles e imposibles, de la herencia han sido aplicadas a la crianza de palomas mensajeras. Algunos criadores han cortejado el éxito siguiendo a la letra las famosas leyes de Mendel. Estas leyes pueden tener cierto valor, desde un punto de vista físico. Sin embargo, otras cualidades, desde nuestro punto de vista, son indispensables, como la inteligencia, el sentido de la orientación, y la tenacidad. No es difícil producir palomas bonitas. No es tan fácil producir palomas buenas. En muchos casos, los machos jóvenes recuerdan a la madre, y las hembras al padre. Ocurre más a menudo que los pichones heredan el carácter de alguno de sus abuelos. No es raro para una paloma parecerse a un ancestro lejano; hereda su plumaje o su carácter. De este modo una paloma pinta aparece en la progenie de una paloma monocolor. Esto es puramente el resultado del atavismo. Si una paloma nos recuerda a un ancestro de buenas cualidades, esto es un buen signo. Nuestros esfuerzos tienden naturalmente hacia la mejora de la raza, aumentando las buenas cualidades, y eliminando las malas. La historia prueba que también hay una tendencia al retroceso. Citando a Darwin: 'cuando individuos de diferentes razas se cruzan, se encuentra en los descendientes una tendencia al pasado, debida a causas desconocidas'. Deduzco que los animales domésticos siempre tienen una ligera inclinación a regresar al estado salvaje. De este modo, la mejor raza de mensajeras puede degenerar sin ninguna causa aparente. Si uno examina la historia de las razas, humana o animal, uno nota que la raza progresa un tiempo, sube por así hablar, llega al cenit, y permanece estacionaria por un periodo más o menos largo según las circunstancias, entonces se establece el declive, y degenera invariablemente. Esta es una ley inmutable, de la que ninguna colonia puede escapar, a menos que uno la retrase por un severo sistema de selección, basado en acoplamientos exitosos. Nuestras palomas heredan las características generales de la raza, pero también heredan características secundarias, si no fuera así todas se parecerían entre ellas; por tal circunstancia surge la gran variabilidad de nuestras palomas. Es a través de esas características secundarias que tenemos una gran influencia mediante la selección y el cultivo.

La elección de los reproductores

Más de una vez he tenido buenos pichones de palomas que fueron malas viajeras. Esto no me impide aconsejar a todos los aficionados usar como reproductoras solo palomas que han dado prueba de buenas cualidades en las carreras. Ya es bastante duro sacar buenos pichones de buenas viajeras, y nadie debe intentar criar buenas palomas de otras que no han sido capaces de ganar buenos premios. Es esencial anotar cuidadosamente los premios ganados por las palomas de uno, y también el tiempo dominante durante la carrera. Las palomas que marcan bien con viento en contra, palomas de gran fuerza, tendrían nuestra preferencia. Esta es la única forma de mantener una buena raza, y de que no degenere. Criando con palomas que no pueden batallar exitosamente contra el mal tiempo, y que no pueden desenvolverse bien en condiciones adversas, ponemos en peligro el futuro de la raza. Los mejores reproductores casi siempre son palomas bien formadas, poderosamente construidas, con alas fuertes, plumaje abundante y suave, músculos firmes, cabezas masivas, y ojos vivos y brillantes. Estas transmiten a sus descendientes no solo las cualidades de la raza, sino también sus cualidades individuales, son la base de toda una línea de buenas palomas. No se deje influir por el origen de una paloma, la mayoría descienden de alguna raza ilustre, lo cual sin embargo, no excluye la posibilidad de haber muchas palomas sin valor entre ellas. Investigue el valor de los padres y de los abuelos para deducir el valor de la paloma. No

obstante, es esencial que la misma paloma sea buena. Esto es más importante que saber de qué raza desciende.

La edad de los reproductores

Si tiene una pareja de palomas que produce buenos pichones, permítales acoplarse cualquiera que sea su edad, tanto tiempo como no detecte ninguna degeneración en la descendencia. Como una prueba, puede acoplar cada una de ellas con otra de 1 o 2 años al principio de la estación de cría, solo para una tanda de pichones. Sin embargo, prefiero palomas de 3, 4, o 5 años; están en la flor de la vida. Cuando se crían pichones con palomas de 1 año, serán más bien para concursos de velocidad, y no tendrán una carrera tan larga como los pichones de palomas más viejas.

Endocría y Exocría

¿Acoplaremos palomas genéticamente relacionadas (consanguinidad) o no relacionadas (cruzamiento)? Cada uno de estos sistemas tiene sus partidarios y detractores. Unos proclaman que solo los cruces son recomendables, mientras que otros dicen que la consanguinidad da los mejores resultados. La verdad se encuentra en el medio de los dos extremos. Mientras unos y otros discuten, nosotros aprovechamos las ventajas de ambos sistemas. Es indiscutible que buenas variedades se han obtenido por cruzamiento. Personalmente hemos tenido campeones criados de esta manera, como nuestro “Big”, “Dark”, “Little”, “Old Blue”, “Bismark” etc. Estoy convencido incluso de que por cruzamiento se obtienen las mejores palomas, especialmente cuando es cuestión de obtener palomas que han de ser la base de la colonia. He experimentado con la consanguinidad desde 1912. Obteniendo de ésta manera palomas destacadas desde todo punto de vista, como mi hembra azul “The Tail” de 1913, mi “Dreamer” de 1915, mi famoso “Baserke” de 1918, etc. A pesar de esto, debo decir que la consanguinidad (en exclusiva) causa degeneración. La mayor ventaja de la endocría consiste en obtener los resultados deseados más rápidamente, es más fácil mantener el tipo. Hay dos sistemas de consanguinidad que he practicado con gran éxito. Primero:



(A) Macho base, azul p/b de 1902.

(b.c.d) Hembras de otras razas.

(AIII) Hembra azul acoplada con su bisabuelo (A) de 11 años de edad, me dio la hembra azul (Ax) de 1913 llamada “The Tail”.

En 1914 acoplé (Ax) de 1 año, con su padre (A) de 12 años, y obtuve de esta unión (Axx) una hembra azul que fue excelente en todos los aspectos. Esta hembra (Axx) fue acoplada con un bisnieto de (A) y toda la progenie fueron buenos viajeros y reproductores, entre ellos mi "Golden Hen". Segundo:



(A''') acoplada con (A) produjo (Ax), y (Ax) acoplada con (AIII) produjo dos machos (Axx): nuestro campeón imbatible con viento fuerte, y nuestro reproductor azul, que no dio ningún pichón malo con una hembra de la misma raza. No obstante, he tenido pichones de parejas consanguineas que han muerto a la semana de nacer. Lo mismo ha ocurrido en otros palomares; un pichón muere a los pocos días, y el otro se vuelve un campeón. Cuando uno practica la consanguinidad, tiene que trabajar solo con palomas perfectas. Es una cuestión de hecho, que la más ligera debilidad se convierte en seria debilidad física. Las palomas deben tener la máxima salud, la más mínima indisposición por parte de alguna es capaz de socavar la raza. He estado en posición de observar muchas colonias de palomas cultivadas en consanguinidad. Casi todas han ido a nada, tras unos pocos años de éxitos brillantes. Las únicas que han sobrevivido, son las que han estado sujetas a una fuerte selección, y han introducido de vez en cuando sangre nueva para regenerar la raza. Es cierto por otra parte que el cruzamiento no es garantía de éxito durable. Muchos aficionados que practican el cruzamiento continuo experimentan el fracaso. Para triunfar con el cruzamiento, ambas palomas deben tener gran afinidad. Es por la falta de afinidad, que la mayoría de los cruces dan mala progenie. Endocría o exocría, cada sistema tiene sus defectos. Es por tanto aconsejable no ir a los extremos, sino adoptar la feliz media, y combinar lo mejor de ambos. En vista de lo anterior, no recomiendo, por ejemplo, la unión de padres con hijos, o hermanos entre si, a menos que, se haga expresamente con el propósito de mantener pura la raza, o se tienen palomas que son absolutamente perfectas en todos los aspectos. Para aprovecharse de las ventajas de ambos sistemas; es decir, la afinidad que existe entre los consanguineos, y el vigor que tienen los cruzados; la endocría debe cultivarse y la exocría practicarse. El siguiente ejemplo ilustra mi pensamiento: supongamos que tenemos dos palomas jóvenes (C) y (D) procedentes de un macho excepcional (A) con una hembra (B) de otra raza, pero del mismo tipo. (C) y (D) se cruzan con otra raza afín (E) y (F). Los productos obtenidos (G) y (H) se acoplan entre sí (consanguinidad).La progenie obtenida de (G) con (H) recuerda mucho al macho base (A) y puede considerarse como la nueva base (AI), con la que se repite otra vez el mismo proceso para obtener (AII), y así sucesivamente. La dificultad más grande es encontrar palomas afines con las suyas. Para ello debe buscar palomas parecidas, y que hayan tenido éxito en carreras de 400 a 600 kilómetros.



Evite incluso esprinters campeones, que solo son buenos hasta 100 kilómetros. Trate de encontrar especialmente palomas de una raza que todavía triunfa; una raza que tuvo su época de gloria y está degenerando es inútil para usted, incluso aunque algunas de ellas todavía se distingan honorablemente. Es una pena que esta degeneración sea tan difícil de detectar. No obstante, se deduce del hecho de que los pichones normalmente son peores que sus padres. Excelentes resultados se han obtenido con los siguientes acoplamientos: (1) Primos entre sí (G x H); (2) Tíos con sobrinos (E x H) o (D x G); (3) Abuelos con nietos (A x G) o (A x H). El siguiente esquema muestra la consanguinidad que yo mismo he practicado:



(A1) es hijo de (A), por cruzamiento.

(A2) es nieto de (A), por cruzamiento.

(A3, A3', A3'', A3''') son bisnietos de (A), por cruzamiento.

(Ax) viene de (A) x (A3).

(Axx) viene de (Ax) x (A).

(Axx') viene de (Ax) x (A3''').

(Axx'') viene de (Axx) x (Axx').

(Axxx) viene de (Axx) x (A3'').

(Axxx') viene de (Axxx) x (A3').

(Axxx'') viene de (Axxx') x (A3''').

Los resultados fueron más que satisfactorios. La progenie no solo se distinguió como viajera y reproductora, sino que también se destacó valiosa para cruzar con otras razas. Muchos aficionados han introducido mis palomas en sus palomares, y los cruzamientos han incrementado la reputación de mi raza.

El entorno

El entorno donde vive, tiene una gran influencia sobre la paloma. No tome la palabra entorno demasiado literalmente. Cuando digo entorno, estoy pensando en el palomar (su situación, construcción, etc), la región (terreno, clima, etc), y la forma en que son cuidadas. Todos estos factores contribuyen a formar un conjunto, del cual depende el desarrollo de la raza de cada palomar. La influencia puede ser favorable o desfavorable; las palomas prosperan o degeneran. Con frecuencia he notado que las palomas nuevas tardan un poco de tiempo en adaptarse a su nuevo entorno, pero habiendo pasado esta etapa, prosperan y dan buenos resultados. La experiencia ha probado que las palomas no pueden permanecer indefinidamente en el mismo lugar, sin sentir los efectos nocivos de una estancia demasiado prolongada en el mismo entorno. Las causas de esto son desconocidas. Solo hay una forma de evitarlo, poniendo las palomas en un entorno diferente. Incluso es un buen plan darle unos pichones a un amigo de confianza, que viva en otro sitio distinto. Después de unos pocos años, los nietos de estas mismas palomas pueden ser traídos de regreso. De esta forma tendrá palomas de un entorno diferente, pero con una gran afinidad por las suyas, ya que son del mismo origen. Siendo el producto de cruces, el peligro de una consanguinidad demasiado fuerte no debe temerse. He conocido algunos aficionados experimentados, que cambiaban sus palomares, cada 10 o 15 años, para forzar un cambio de entorno. Ciertos animales que viven en una región durante muchos años, pierden mucho de sus cualidades reproductoras y de su valor para el cruzamiento, cuando son llevados a una región diferente; diferente tipo de suelo, diferente ambiente, y sobre todo, diferentes cuidados. Solo la próxima generación recupera todas sus facultades. Este peligro no debe ser temido con las palomas, al ser estas ya el producto de un enorme número de cruzamientos. Es de destacar el gran número de pichones que se pierden del palomar hacia su segundo mes de vida. En algunos es por falta de inteligencia, y en otros es por retornar al estado salvaje, es el instinto el que los incita a hacerlo. Su impulso es emigrar a otro lugar, y fundar otra raza allí. De esta forma, muchos pichones de una raza dada se extravían cuando mudan su primera remera. Los de esta clase, que uno logra retener, normalmente se vuelven buenos viajeros.

-

EL AQUERENCIAMIENTO

Es posible obtener buenos pichones de palomas mantenidas cautivas durante un año; sin embargo, eso es la excepción. Uno puede poner buenos reproductores en un buen aviario, y dejarles criar el primer año. Los pichones no sufrirán por la cautividad de sus padres. No será así el segundo año. Es necesario, por tanto, aquerenciar las palomas cautivas al nuevo palomar.

El aquerenciamiento de una paloma

Primer requisito: construir un pequeño soleadero o reconocedor, una jaula pequeña en la cual la paloma extraña se pone para que reconozca las inmediaciones. Segundo requisito: acople la paloma a aquerenciar con otra de su propio palomar. Tercer requisito: no maltrate a la paloma; póngala en el reconocedor por la noche; pasará la noche en el lugar, y cuando el día llega, se acostumbrará a su nueva casa. No intente soltar la paloma mientras no reconozca el lugar, acostúmbrela primero.

Aquerenciamiento de un macho

Aparéelo con una hembra que ya está aquerenciada al lugar y, si es posible, póngalos en un criadero separado, desde el cual puedan ir a voluntad al reconocedor situado fuera del palomar. Un agujero sirve como salida. Tan pronto como las dos palomas se acoplen, retire el soleadero y suelte la hembra para que se acostumbre a entrar por el agujero. Para lo anterior, se requieren uno o dos días como mínimo. El tercer día, se suelta la hembra, preferiblemente por la mañana y sin comer. Cuando ella aterrice, eche unos pocos granos sobre la plataforma de aterrizaje frente al agujero de entrada y deje salir al macho, el se juntará con su hembra, y al estar hambriento se pondrá a comer el grano. Déjelos ahora a su aire. Probablemente la hembra entre y salga otra vez, seguida todo el tiempo por el macho. La pareja se quedará sobre el techo y el macho se irá acostumbrando más y más al lugar. Si no vuela el primer día, tanto mejor para el aquerenciamiento. En los siguientes días, se elevará para caer sobre la tabla de aterrizaje, o para retornar a su antiguo palomar. Procure que no encuentre allí ni alimento ni una hembra que cortejar; cójalo tan pronto como pueda, regréselo a su criadero y dele un poco de grano para comer en compañía de su hembra. Puede ocurrir que tenga que ir a buscarlo una segunda vez. Si continúa regresando a su viejo palomar, espántelo desde allí pero nunca al anochecer; pronto aprenderá a retornar a su nueva casa; el hambre y la hembra lo atraerán.

Aquerenciamiento de una hembra

Esto es más fácil que en el caso de un macho. La hembra extraña reconoce el lugar a través del soleadero, al que puede acceder libremente. Déjela sola cuando incuba de unos pocos días, es el momento más favorable. Por la mañana, suelte las demás palomas; no las encierre en todo el día; permítales entrar y salir cuando deseen. La hembra a aquerenciar, dejará sus huevos hacia las 10 am; al ver a las otras palomas fuera, saldrá a la plataforma de aterrizaje, pero no se echara a volar, permanecerá con las demás en la tabla o en el techo. Si vuela y se va, corra a buscarla inmediatamente; póngala en el palomar; como está hambrienta, aceptará unos pocos granos; no la encierre, déjela salir otra vez; ella finalmente cogerá el hábito de entrar y salir con las demás palomas. Si es necesario, espántela desde el viejo palomar, como en el caso del macho.

Aquerenciamiento de todo un palomar

Debido a nuestra mudanza en el año 1919, tuve que aquerenciar de nuevo todo mi palomar. Desmonte el viejo palomar, y lo volví a montar en la nueva casa. Las palomas disponían de un gran soleadero de (1.8 x 1.8 x 1.8) metros frente al palomar, al que tuvieron acceso todo el mes de Diciembre. Un día soleado, dejé salir a los machos; volvieron inmediatamente a la vieja casa, y estuvieron allí dos días y dos noches. Mis amigos predijeron que nunca volverían al nuevo hogar. Sin embargo, la mañana del tercer día, regresaron y se posaron en el techo, entraron a la primera llamada; así aquerencie a todos mis machos. Seguí el mismo plan con las hembras, y no perdí ni una sola de mis treinta y dos (32) palomas. La distancia era de unos dos (2) kilómetros. Fue un método drástico, pero rápido y seguro. A los que piensan que este plan es demasiado arriesgado, les sugiero que las deje retornar a su viejo palomar, donde no deben encontrar nada, las cuatro paredes vacías, sin posaderos, sin luz, sin comida, e incluso sin agua. Aquerencie primero a los machos, y después a las hembras. Tráigalas solo dos veces, y luego espántelas desde el viejo palomar agitando un pañuelo, o una bandera grande.

Observaciones

(1) Para aquerenciar una paloma, no es necesario que esté muchos días en el reconocedor; unos pocos días es suficiente.

(2) Aquerencie sus palomas por la mañana, en un día bueno. Durante el invierno no aquerencie una paloma que vivía muy lejos; espere a la buena temporada.

(3) No las aquerencie cuando tienen pichones pequeños; este es el momento más peligroso.

(4) Cuando se introduce una paloma extraña para mejorar la raza, no la libere sin que haya incubado huevos o pichones; si es un macho, aquerénciela cuando tiene un pichón grande; si es una hembra, suéltela cuando esté incubando, y ponga sus huevos bajo otras palomas.

(5) Ciertos aficionados ponen esparadrapo en las remeras para que no puedan volar; otros las untan con almidón, o con jabón, que se pueda lavar rápidamente; pero ¡Nunca corte las remeras de las palomas valiosas!

-

LA CRIANZA

El método natural

El plan más simple es poner en el palomar igual número de hembras y machos, y dejar que se acoplen como más les guste. Este es el método más natural y, de acuerdo con la supervivencia del más fuerte, el mejor: los machos más fuertes tendrían las hembras más fuertes, y las mejores palomas se acoplarían juntas. En teoría está muy bien, pero no funciona en la práctica, por las siguientes razones: las palomas no afines se acoplarían juntas; se pueden formar parejas muy consanguineas; y no podríamos aplicar el principio de compensar virtudes y defectos. Además, dejarlas que se acoplen de forma natural, implica peleas, con las consecuencias de plumas rotas y ojos picados. No habría armonía en el palomar; algunas tendrían huevos o pichones, mientras que otras todavía estarían cortejándose; los esprinters se acoplarían con las fondistas; y todo sería una gran confusión cuando llegan los concursos.

La fecha para acoplar

Esta varía según la finalidad que uno tiene en mente. Para las carreras cortas, acople los esprinters a comienzo de Febrero. Si quiere que los fondistas estén en pleno vigor para las carreras largas, acóplelos al final de Febrero. Haga la siguiente clasificación: (1) Palomas de un año. (2) Esprinters adultos. (3) Fondistas adultos. (4) Reproductoras. (5) Pichones tardíos.

Palomas de un año

Estas son el futuro del palomar, y deberían cuidarse muy bien. No las viaje mucho, ni les críe demasiado. De acuerdo con mi experiencia, acóplelas más bien tarde, y no las viaje hasta que llegue el buen tiempo, en Mayo.

Esprinters adultos

Estos toman parte en las primeras carreras, a mediados de Abril. Para que puedan estar incubando por segunda vez, los acoplo hacia el 15 de Febrero; tendrán huevos hacia el 25; pichones hacia el 15 de Marzo; pondrán otra vez hacia el 7 de Abril, y tirarán la primera remera hacia el 17, antes de comenzar a viajar.

Fondistas adultos

Estos todavía tendrían el plumaje completo a finales de Junio, porque es entonces cuando empiezan las carreras de fondo. Por tanto, para que la muda no comience demasiado pronto, acóplelas entre el 1 y el 15 de Marzo.

Reproductoras

No las acople antes del 15 de Febrero; sus primeros pichones nacerán hacia mediados de Abril, y de ese modo se beneficiarán de la llegada del buen tiempo. Criar en Enero o Febrero, sería la excepción, con una paloma prestada por ejemplo. No apruebo que los aficiona-

dos acoplen demasiado pronto (finales de año) para tener pichones precoces a principios de año. En el caso de las reproductoras viejas, no las acople hasta Abril.

Pichones tardíos

Estos, al ser la reserva, es mejor no acoplarlos. Nacen al final de la estación deportiva y, por tanto, necesitan todas sus fuerzas para su propio desarrollo. Yo los dejo en el palomar, a su aire. Hacerlos criar constituiría un hándicap para su crecimiento, y también interferiría su muda normal. Los tardíos solo se mantienen para obtener buenos resultados de ellos durante su tercer año. Las hembras tardías, especialmente, no se deben acoplar, pues la puesta es perjudicial para su desarrollo. No se deben conservar los tardíos a menos que sean perfectos en todos los aspectos; un retraso en su desarrollo no es nada favorable. El mejor plan es poner los tardíos en el palomar de pichones; entonces no se acoplarán hasta Agosto, cuando la puesta y la crianza ya no les es perjudicial. Los tardíos, en ocasiones, producen excelente progenie.

Método para acoplar las palomas

Más de un aficionado ha tenido dificultad para acoplar sus palomas. Algunos machos no aceptan la hembra destinada para él. Algunas hembras pelean continuamente con el macho con el que deben acoplarse. Ciertas parejas permanecen en el criadero nada más que mirándose. Todas estas dificultades son culpa del aficionado: pone un macho y una hembra en el criadero, y los deja encerrados hasta que se acoplan. Se comprende fácilmente que ciertas palomas se pongan de mal humor un tiempo, y después se acoplen en contra de sus inclinaciones. Todo aficionado debería saber que las palomas que se acoplan en contra de sus inclinaciones, no harán nada en las carreras, e incluso la crianza sufrirá. El método descrito aquí es el que he seguido durante muchos años, y es el que recomiendo para evitar las dificultades a las cuales me he referido. Cuando llega el tiempo de acoplar, encierro a todos los machos, solos, en los criaderos que tienen asignados; entonces pongo una hembra en el palomar y abro el criadero del macho que tiene destinado; estando separados desde Diciembre, enseguida el macho empezará a cortejarla; como no hay otras palomas sueltas, se acoplan inmediatamente; después de 15 minutos, o media hora, las encierro en su criadero; no se pelearán; pero si el macho la pica demasiado, sepárelas hasta el día siguiente. Cuando la primera pareja se encierra, traigo otra hembra al palomar y abro el criadero de su correspondiente macho. Repito el procedimiento con cada pareja. Cuando todas han tenido su turno, comienzo a abrir otra vez el criadero de la primera pareja durante 15 minutos, para que puedan comer y beber; si están demasiado ocupadas entre ellas, y no comen ni beben, no se preocupe, lo harán el próximo día. Al día siguiente, abro dos criaderos al mismo tiempo, teniendo cuidado de no elegir dos que estén muy próximos. Siempre les dejo 15 minutos de libertad; las parejas se acoplarán y aprenderán como volver a su criadero. Por la tarde del segundo día, abro tres o cuatro criaderos simultáneamente. Desde el cuarto día, abro todos los criaderos. No hay que decir, que debe vigilar que las palomas no peleen demasiado. Con este método, nunca tardo más de una semana en acoplar todas mis palomas. Todas conocen su criadero, y puedo dejarlas en libertad sin ningún peligro. Es aconsejable separar las palomas unos días, después de la estación deportiva. Serían reacopladas, por tanto, al final del verano, como siempre lo serían cada año. Esto es un plan muy ventajoso, ya que

criamos un par de pichones de cada pareja, para comprobar el resultado del acoplamiento; de esta forma, podemos saber pronto si es aconsejable dejar la pareja como está.

Cambio de pareja

Si se desea acoplar una hembra con otro macho, aíslela durante varios días. El día fijado, encierre todas las palomas en sus criaderos; solo deje libre en el palomar a la hembra viuda, y suelte al nuevo macho; pronto se acoplarán; déjelos juntos unos 15 minutos; y luego enciérrelos en el criadero del macho. La hembra pronto sabrá donde tiene que ir, especialmente cuando ha puesto; se olvidará de su viejo criadero, no hay peligro en dejar al antiguo macho en el palomar. Es aconsejable, siempre que sea posible, dejar que los machos ocupen los mismos criaderos que el año previo. Es más fácil cambiar a las hembras; los machos ocasionalmente vuelven al viejo criadero, y se producen batallas con los nuevos ocupantes. Puede suceder que un macho sea celoso, y no deje un momento de reposo a su hembra; la fatiga resultante puede afectar la fuerza de la progenie; para impedir esto, solo es necesario encerrar la pareja durante buena parte del día; no hay objeción a poner un pequeño bebedero en el criadero durante el periodo de acoplamiento, para que puedan beber cuando lo deseen; pero tenga cuidado de que no ensucien el agua.

La puesta

Cuando se ve que las palomas se han acoplado, hacia el séptimo día se echa un puñado de ramitas en el palomar, para que las palomas hagan su nido. La paja contiene muchos huevos de insectos, prefiero los tallos de tabaco. Me gusta ver a las palomas hacer un buen nido; esto es típico de los campeones. Durante la construcción del nido, la hembra tendrá más reposo. Ella pone, normalmente, hacia el décimo día, sobre las 4.30pm. El segundo huevo lo pondrá al duodécimo día, sobre las 2pm. Es aconsejable darles a las palomas un puñado de Linaza cada día después del acoplamiento; el mucílago que contiene este grano facilita la salida de los huevos. Inspeccione los nidos, para ver si hay huevos sin cáscara; se encontrarán si han estado cautivas, o no han recibido sustancias calcáreas. Siempre tenga en el palomar un comedero pequeño, lleno de buen grit, que puede adquirirse en las tiendas especializadas. Examine las hembras que no han puesto hacia el décimo día; si encuentra una que tiene dificultad para poner, lubrique la cloaca con una pluma mojada en aceite. Para ayudar a la hembra, dele una píldora laxante, o sal de Carlsbad (una cucharadita por un cuarto litro). Si todavía no puede poner, y ve que está sufriendo, puede hacer un esfuerzo por salvarla: (1) Después de poner aceite en la cloaca, ponga sal en el lugar, y déjela en el nido, debería poner al instante. (2) Si todavía no da resultado, trate de romper el huevo metiendo el dedo por el ano, pero luego retire cuidadosamente la cáscara. Esta operación es muy peligrosa, y es mejor consultar a un especialista. Tenga huevos artificiales (huevos de paloma previamente hervidos) para reemplazar los huevos sin cáscara, y los huevos rotos. Si el huevo está ligeramente dañado, a veces puede repararse con cinta adhesiva. Ciertos aficionados retiran los huevos tras unos pocos días de incubación, para hacer que la hembra vuelva a poner otra vez; esto es muy peligroso; uno no debe pedir demasiado. Es mejor dejar que la hembra incube diez días; después de eso, retire la hembra del palomar durante una semana; entonces puede acoplarse otra vez, y poner sin ningún peligro para su salud.

La incubación

Los mismos pichones rompen la cáscara; para este propósito, su mandíbula superior viene provista de una pequeña dureza; con golpes repetidos, el pichón triunfa en abrir el huevo, 17 días después de la puesta del segundo; en ocasiones 18 días, si el tiempo es muy frío. Puede ocurrir que el pichón no pueda salir del huevo, al ser la cáscara demasiado dura. Es necesario ayudarlo, levantando con la uña del dedo parte de la cáscara, sin tocar la membrana interior. El pichón entonces es bastante fuerte para liberarse el mismo. Si no quiere que las palomas críen ellas mismas sus pichones, reemplace los huevos por otros artificiales; las palomas continuarán incubándolos varios días más de lo normal.

Los pichones

Cuando las palomas han incubado 13 o 14 días, empiezan a formar la papilla, que es el alimento de los pichones durante sus primeros seis días de existencia. Note que los padres comen más de lo normal algunos días antes de la eclosión. Todos los pichones no nacen al mismo tiempo; algunas veces habrá diferencias de varias horas. El primer pichón sale del huevo puesto en último lugar. Hacia el séptimo día, ya se encontrará algunos granos en el buche del pichón; es entonces cuando se le coloca la anilla; si esto se retrasa mucho, la anilla no entrará al ser la pata demasiado grande; no obstante, debe anillarse, untando la pata con aceite para que la anilla pase más fácilmente. Después de anillarlos, cámbieles el nido, ponga un nido limpio con buenas ramitas. No vuelva a tocar los pichones otra vez; no mueva el nidal; ni incluso limpie las cagadas. Tengo el hábito de poner alrededor del nido una capa de arena mezclada con cal; esta mezcla absorbe la humedad; también puede usar la ceniza (carbón vegetal). El polvo de cal se obtiene poniendo piedras de cal en una caja abierta; la humedad del aire reducirá las piedras a polvo fino. Los pichones deben reposar tranquilamente en el nido; si no están callados y chillan constantemente, hay algo equivocado con ellos, o los padres no los nutren adecuadamente. No debe perder el tiempo con este tipo de palomas. Si salen del nido antes de 16 o 17 días, o si sus excrementos no son sólidos, elimínelos; nunca llegarán a ser buenos viajeros. Sus padres no son lo que deberían ser. Elimine drásticamente todo pichón que no crece normalmente. Cuide bien los pichones que están tranquilos en su nido y se desarrollan bien. Fíjese en que los pichones fuertes expulsan sus excrementos fuera del nido. Los pichones bien cubiertos de plumón, tendrán un plumaje abundante; los de ciertas razas, tendrán las patas negras; y los que tienen el pico claro, suelen tener plumas blancas, en el cuerpo y/o en las alas.

El destete

Tengo el habito de poner un poco de grano en el criadero cuando los pichones tienen 20 días de edad; de esta forma aprenden a alimentarse solos. Se deben destetar cuando tienen 25 días. Algunos dirán que es demasiado pronto, y que es mejor para ellos dejarlos con sus padres. El destete debe comenzar la tarde del día 25, es el momento más favorable. Al día siguiente apenas comen. Meta su pico en el bebedero, para que sepan dónde encontrar el agua. A partir del día 27, comen y beben, y se desarrollan mejor que los destetados a las 5 semanas de edad. Compruebe que beben lo suficiente; solo es necesario palpar el buche para saberlo. Si no han bebido, meta otra vez su cabeza en el bebedero. Cuide que las adultas no picoteen a los más jóvenes, especialmente cuando salen fuera. Muchos pichones se pierden el primer día que salen; esto depende mucho de la raza, y también, permítame decirlo,

del propio aficionado. Apenas pierdo pichones, pues los pongo en la plataforma de aterrizaje hacia el día 26, para que conozcan el lugar. Se acostumbran al vecindario antes de empezar a volar. Algunos dejan el palomar, y se quedan fuera hasta el día siguiente; vigile a estos, entre ellos encontrará a sus mejores palomas. Algunas veces ocurre, que las patas del pichón que está solo en el nido, se abren demasiado, y se deforman, y el pichón estará condenado a menos que se remedie a tiempo; coloque el pichón entre dos topes de ramitas, para que sus patas no se separen tanto.

-

EL ENTRENAMIENTO

El entrenamiento no solo consiste en unas pocas sueltas, dadas a las palomas antes de los concursos, sino también en su adiestramiento. Amansar a las palomas es la primera cosa; las palomas salvajes no traen más que problemas, y ninguna ventaja. Para tener palomas mansas, debe lograr que ellas siempre le tengan a la vista; vaya al palomar de la misma manera cada día, sus palomas aprenderán a reconocerlo. Manténgase calmado, no se agite, no importa lo que suceda; hablele a sus palomas, como haría con un bebé. Cuando vaya a cogerlas, no las persiga; si le resulta difícil, recurra a esta estratagema: eche unos granos apetitosos (en la tabla de alimentación), las palomas irán a por ellos, y será capaz de cogerla de entre el montón. No obstante, solo hay una forma de amansar a las palomas: nunca les dé de comer más que en su mano; las que no van, pasan hambre, y al día siguiente habrán aprendido. Si tienen el grano constantemente ante ellas, use un poco de Postre (Alpiste, Mijo, Cardi, Cañamón) para engatusarlas; lleve siempre un poco de Postre en el bolsillo; las palomas vendrán a usted por él. Las palomas salvajes, perderán mucho tiempo en entrar los días de concurso; pero de las palomas mansas, será capaz de retirar el Rosoor inmediatamente.

El ejercicio

El mejor sistema consiste en dejar abierto el palomar día y noche. Tan pronto amanece, las palomas salen, si desean hacerlo. Vuelan alrededor del palomar, se van a los campos, o se quedan en el techo, lo que más les guste; siempre al aire libre y puro; de este modo obtienen la máxima cantidad de oxigeno, enriqueciendo su sangre. Debido a unas pocas causas: aves de presa, o peligro de envenenamiento por insecticidas que las palomas ingieren por las sales que contienen, habrá algunas bajas; pero la libertad completa es tan buena, que unas pocas bajas tienen relativamente poca importancia.

Vuelos forzados

Hay muchos aficionados que no podemos dejar el palomar abierto todo el día, como los que habitamos en las ciudades. Los vecinos, los gatos, los desagües sucios, etc, son obstáculos, al igual que los pequeños jardines. Las palomas alojadas en un palomar de jardín enseguida se enferman si se dejan todo el día sueltas. Además, los canalones de desagüe de las casas vecinas son el lugar favorito de reposo para las palomas, donde con seguridad se van a envenenar, y también los pequeños jardines donde crece todo tipo de plantas venenosas. Por estas razones tengo que encerrar mis palomas durante el día; el ejercicio, no obstante, es indispensable para ellas; mejora su digestión; la circulación de la sangre es mejor; y sus músculos se tonifican. En verano, abro la salida a las 6am; mientras las palomas están volando limpio el palomar. Permanecen fuera hasta las 7 am; esta es la hora de la primera comida. La segunda salida toma lugar desde las 12 am hasta la 1 pm, y la tercera, desde las 4.30 pm hasta las 5.30 pm. Mis palomas salen a volar en toda clase de tiempo, excepto cuando nieva o hay neblina. Los machos, mañana y tarde; las hembras, al mediodía. La comida se sirve después de cada vuelo. Las horas mencionadas no necesitan copiarse, cada aficionado debe elegir las horas que más le convienen. No obstante, es necesario ser metódico y regular, no se puede soltarlas por ejemplo: un día a las 6 am y a las 4 pm, y al día siguiente a las 9 am y a las 6 pm; las salidas siempre deben ser cada día a las mismas horas. Dos salidas cada día son suficientes en caso de necesidad, digamos de 7.30 a 9 am, y de 3 a

4.30 pm. Vigile sus palomas cuando abre la salida, algunas son reacias a salir, sospeche de estas. Prefiero palomas llenas de actividad que salen inmediatamente; las otras no están a la altura: o están demasiado gordas, o no están sanas. Me gusta particularmente las palomas que no regresan con el bando, sino que continúan volando, las que disfrutan usando sus alas. Digamos, de paso, que muchos aficionados fuerzan a sus palomas a permanecer en el aire de 30 a 60 minutos, agitando una bandera para evitar que se posen en la plataforma de aterrizaje. El ejercicio regular es particularmente beneficioso para las palomas reproductoras. Sin embargo, no imponga este sistema repentinamente a sus aves; hágalo gradualmente, digamos: 10, 15, 20, 30 minutos; si desea más tiempo, deles la semana siguiente 45 minutos; y más adelante 60 minutos. Este sistema tiene la ventaja de permitirnos ver las palomas más débiles; esas no serán capaces de soportar el esfuerzo tanto tiempo; las fuertes no se cansarán.

El entrenamiento de las adultas

Nunca comience demasiado pronto; es durante MARZO y ABRIL cuando se pierden la mayoría de las palomas; así como en SEPTIEMBRE. No sea impaciente, el éxito es para los que saben esperar. Entrene sus palomas cuando los árboles se llenan de hojas. Yo comienzo con sueltas individuales desde 10 kms; después van con el Club, o la Federación, a 20, 50, y 100 kms; entonces están listas para ir a los concursos; las veteranas saltan con seguridad a 400 kms; y desde allí, a cualquier distancia. Los júnior (palomas de un año) hacen 100, 150, 200, 250, y 300 kms. Que regresen muy tarde de las primeras sueltas apenas me preocupa. Me fijo particularmente en las que retornan frescas volando con el viento en contra. Una paloma a la que le cansa el entrenamiento no promete nada bueno. Debe aprovechar la oportunidad de entrenar sus palomas contra el viento, esta es la mejor forma de conocer sus capacidades. Los que tienen poco tiempo, les aconsejo sueltas individuales desde 50 o 60 kms. Suelte sus palomas individualmente desde 10, 20, 40, y 60 kms; este es el mejor aprendizaje; perderá algunas palomas, pero casi siempre serán las menos valiosas. Este entreno toma lugar antes de los concursos. Es aconsejable que las palomas tengan una suelta corta (de 10 a 20 kms) antes de cada concurso, preferiblemente por la mañana, y soltadas una a una; yo normalmente las suelto en la dirección contraria a la línea de vuelo, y le doy una buena nota a las que se orientan inmediatamente.

El entrenamiento de los pichones

No se demore mucho en ponerlos en la cesta. Para acostumbrarlos a estar en ella, los pongo en una provista de bebedero; aprenden de esta manera a comer y beber allí; este es su primer ejercicio, y se hace varios días antes de comenzar las sueltas. Después los suelto todos juntos a cierta distancia del palomar; luego, las sueltas individuales son el ejercicio principal, estas siguen la secuencia siguiente: 10, 20, 40, 60, y 100 kms. Las sueltas individuales de 20 y 30 kms son especialmente buenas; y también una suelta de 20 kms, pero en dirección opuesta a la habitual línea de vuelo. Los mismos pichones le dirán a usted cuando es tiempo de comenzar el entreno: salen por la mañana y no regresan hasta la tarde; este es el momento de comenzar, si no lo hace PERDERÁ pichones.

Consejo importante

Si está tratando con pichones que no conoce, entrénelos severamente, hasta 300 o 400 kms; solo mantenga los que den prueba de buenas cualidades; los otros elimínelos, incluso si son de origen ilustre. No hay nada malo en aumentar el test y enviarlos a 500 kms; una distancia mayor es demasiado para un pichón, a menos que se le deje reposar todo el año siguiente. Si conoce su raza, un entreno hasta 100 kms es bastante para el primer año. Debe elegir los pichones que mejor representen el tipo de su raza. El segundo año van a distancias entre 400 y 600 kms. El tercer año van a cualquier distancia. Solo excepcionalmente de grandes saltos con los pichones; por ejemplo: 20, 50, 100, y 250 kms; los pichones buenos regresan de tales distancias si el viento y el tiempo no es demasiado adverso; pero con mal tiempo las pérdidas son cuantiosas. Si un pichón regresa tarde de un entreno déjelo descansar tres semanas, y luego suéltelo desde 5 kms varias veces solo y en grupo. Hay algunos pichones que se entrenan bien, mientras que otros maduran más lentamente ¡conozca su raza!

-

LA PREPARACION PARA LOS CONCURSOS

La preparación no es solo el entreno, como muchos aficionados piensan, dura todo el año. Paradójicamente, puede decirse que con nuestras palomas recogemos en el verano lo que sembramos en el invierno. Es insensato dejar de cuidar a las palomas tan pronto termina la estación deportiva. ¡Cuide especialmente la salud de las palomas durante los meses de reposo!: abundante aire y luz; ejercicio; buena comida; agua limpia; y púrguelas dos semanas antes de los acoplamientos, también en el mes de Junio, y después de los concursos, en Agosto o Septiembre. Una paloma puede estar en perfecta salud, y sin embargo no ganar ningún premio; por esta razón, muchas palomas, además de buena salud, necesitan algo que las motive a hacer un esfuerzo especial, como incubar, criar, etc. A esta circunstancia estimulante se la llama: la posición.

La posición de enceste

Hay palomas que siempre están en buena posición para ganar premios, con toda clase de tiempos, y cada vez que son encestadas. Son la excepción, y desgraciadamente no existen muchas. Tenemos que contentarnos con palomas que ganan buenos premios cuando están en alguna circunstancia especial, en posición como dijimos antes. Esta posición difiere de paloma a paloma, y siempre se repite de una estación a otra. Es por tanto importante conocer la mejor posición de cada paloma. Solo la experiencia le enseñará lo que necesita cada una para dar su máximo. En consecuencia, las reglas siguientes, solo son generalidades.

La posición del macho

El macho está en su mejor posición cuando tiene pichones grandes o huevos; ciertos machos hacen el mayor esfuerzo cuando su hembra ha puesto el primer huevo. No tengo mucha confianza cuando están cazando al nido; apenas los encesto en esa posición, excepto en el caso de un macho fuerte, y para un concurso de larga distancia; lo mismo se aplica a un macho con pichones muy pequeños. Una excelente posición, es cuando tiene un pichón de 10 a 12 días, y comienza a cazar al nido de nuevo.

La posición de la hembra

No encesto mis hembras cuando los machos las están cazando, aunque ciertos aficionados obtienen buenos resultados cuando están para poner el día del enceste; esto es una practica cruel, y debilita a la paloma. Enceste sus hembras tan pronto como estén incubando de algunos días; nunca el día antes o después de poner; la puesta de dos huevos requiere un esfuerzo grande, y un pequeño reposo solo puede beneficiarlas. Entre más tiempo lleve incubando, mejor será su posición; dele la preferencia a las hembras cuyos huevos deben eclosionar el día de la suelta. A pesar de lo que muchos escritores dicen, no confíe en una hembra cuyos huevos se abren antes de ponerla en la cesta; he comprobado una y otra vez que tal posición no es propicia para la mayoría de las hembras, incluso si son campeonas. Muchas hembras desarrollan su mayor velocidad cuando tienen un pichón de 4 o 5 días de edad el día del enceste; incluso algunas solo ganan premios en esa posición. Para los concursos de fondo, los mejores resultados se obtienen con hembras que incuban de 10 días, o tienen pichones de 8 a 10 días de edad.

Otras consideraciones

La caza al nido, la incubación y la crianza, son circunstancias estimulantes para las palomas, pero lo que es favorable para unas, es desfavorable para otras; esto se nota bastante rápido: la paloma adelgaza cuando pierde su buena condición. Una gran desventaja de los concursos es la dificultad de hacer que las palomas continúen incubando después del regreso. Yo siempre tomo la precaución de colocar sus huevos, o pichones, debajo de otras parejas que todavía están juntas; si es necesario puede colocar los huevos en una incubadora. La pareja de la paloma que está fuera se pone en una cesta, machos y hembras separados, en un lugar a la sombra, y les doy de beber más bien que de comer. Al regreso de los viajeros, los prisioneros se devuelven al palomar, y todas las palomas continúan incubando, o criando sus pichones, según sea el caso. Las palomas que no fueron a concurso, y cuyas parejas están fuera, se retiran del palomar el día del enceste, y sus criaderos se cierran. Si no se toma esta precaución, hay mucho riesgo de que las palomas que permanecen abandonen sus huevos o pichones, y cuando retornen las otras también los abandonen. La posición varía con la edad de la paloma; la incubación es el tiempo más favorable durante los dos primeros años; después de eso, los pichones son el estimulo más grande para regresar rápidamente; y también la caza al nido. Mi "Basserke", una hembra tardía de 1918, ganó muchos premios incubando, en 1919 y 1920. Luego ganó sus mejores premios sobre pichones, en 1921; en 1922, hizo la velocidad más alta sobre pichones de 5 o 6 días; después, en 1923, 1924, y 1925, nunca falló su premio sobre un pichón de 15 días. Un buen aficionado toma nota de cuando los huevos son puestos, para saber exactamente el día en el que eclosionan. Esta es una precaución muy necesaria, especialmente durante la estación deportiva, cuando los huevos son cambiados de criadero. Marque los huevos con un rotulador para que no haya confusión. Siempre anote la posición de la paloma, y el premio ganado en esa posición. Cuando la posición vuelve, mire sus notas, será capaz de predecir, más o menos, que será capaz de hacer su paloma. No olvide que su paloma debe estar en su mejor posición el día de la suelta, no el día del enceste. La influencia de la posición crece durante unos pocos días, luego mengua. Su paloma debe ser encestada cuando la influencia está en aumento; si el efecto de la posición está menguando y encesta la paloma, digamos el jueves, la posición será más baja todavía el domingo y la paloma no marcará bien. Esta es la causa de que muchas palomas, de las cuales se esperan maravillas porque están en gran forma cuando son encestadas, fallen debido a que se les pasó el clímax de la posición el día de la suelta. No se deje engañar por la hazaña de la paloma en el concurso anterior.

Algunos trucos

El buen aficionado sabe como ejercer cierta influencia en la posición de sus palomas: (1) Prolongando el periodo de incubación: Si uno tiene una paloma que marca bien mientras incuba, es posible prolongar la posición más allá de la duración normal. Unos pocos días antes de que eclosionen los huevos, se sustituyen por otros puestos más tarde. La paloma continúa incubando uno o dos días más, suficiente para ponerla en la cesta en su mejor posición. Vigile la papilla que forma la paloma después de incubar 15 días; no usarla, a veces, es causa de problema (putrefacción); para remediarlo deje un pichón grande con la paloma; mientras dura la incubación, el pichón se beneficia de esta papilla. No use huevos artificiales durante la estación deportiva; la paloma detecta el cambio al voltear los huevos y su entusiasmo disminuye (mejor usar huevos de paloma hervidos). (2) Con pichones: (2.1) Ciertas palomas marcan mejor mientras tienen pichones, especialmente las hembras. Esta afección

maternal, puede explotarse cuando la paloma incuba más de 14 días; media hora antes de encestar, sustituya un huevo por un pichón pequeño; espere un rato, y luego suéltela; regresará inmediatamente para alimentar al pichón; entonces encéstela, marcará bien el día del concurso. (2.2) Para mantener el ciclo, devuelva los huevos a la paloma a su regreso; lo importante es mantenerla en el nido; el día del enceste, dele otra vez un pichón pequeño. Si la paloma abandona los huevos, dele un pichón, seguramente lo alimentará. Una paloma que ha estado incubando de 10 a 12 días, puede dársele facilmente un pichón de hasta 7 días. (2.3) Ciertas hembras, pueden encestarse más de una vez sobre pichones pequeños; la primera vez, se encestan con pichones de 5 a 7 días; cuando regresan, encuentran un pichón de 6 días en el nido; permanecen con él hasta el próximo enceste; ciertos aficionados, prolongan la posición, cambiando el pichón por otro más joven, después del segundo regreso. (2.4) Yo prefiero dejar sola la hembra con un pichón de 14 a 15 días; el día anterior al enceste, retiro el macho, el cual no vuelve al palomar hasta que se encesta la hembra; lo importante es que la hembra no pierda interés por el pichón y empiece a buscar otro macho; he tenido hembras imbatibles en esta posición de viudez parcial (semiviudez). (3) Provocando una pelea: Si tiene un macho que no se esfuerza como debiera, debe buscar un medio de espolearlo; ponga en su criadero otro macho, que esté muy hambriento, y eche un poco de comida para que se quede dentro; su macho perezoso verá al intruso y empezará a cazarlo; antes de que lo expulse, saque al perezoso, que regresará al instante para pelear; repita esto dos o tres veces para espolearlo; entonces cójalo mientras pelea y encéstelo; el día de la suelta se dará mucha prisa. Este truco se puede ensayar cada semana, para mantener espoleado un macho perezoso; puede pelear una o dos veces por semana, pero cuide que el siempre gane. Un mejor resultado se puede obtener de una hembra incubando, o con un pichón pequeño, provocando una pelea como la indicada; pero sustituya los huevos por otros artificiales para que no se rompan.

La semiviudez

Esta es más fácil de trabajar; ya he dicho algo sobre la hembra dejada sola con su pichón por una o dos semanas. Si se desea viajar un macho, varias semanas seguidas, su hembra se retira el día tras el concurso, y no vuelve al palomar hasta un rato antes de encestar su macho; este estará muy entusiasmado; no les permita acoplarse; la hembra puede encerrarse en el criadero, el día del enceste, desde por la mañana; el macho estará en la tablilla de entrada al criadero en un gran estado de excitación; entonces se coge para llevarlo a la Federación; el día del concurso hará su mayor velocidad para encontrar a su hembra.

Machos sin hembras

Ocurre con frecuencia que un macho se queda solo; la razón puede ser que su hembra se haya perdido; más de un aficionado tendrá el dilema de cómo afrontar la situación; yo trato al macho como reserva; además, el me ayuda a consolidar la posición de otros machos; como cuestión de hecho, los solteros o viudos, siempre están activos, nunca reposan; persiguen a todas las hembras, se meten en todos los criaderos, y obligan a los demás machos a estar alertas. No hay nada que impida encestar estos machos, sin darles una hembra; deles un criadero, ellos lo defenderán; tendrán una gran afección por su hogar, y volarán bien. Si no va bien, se puede poner una hembra en el criadero un rato antes de encestarlo; el macho

comenzará a cazarla inmediatamente, y cuando sea liberado el día del concurso se apresurará por encontrar su hembra, la cual entonces se retira hasta el próximo enceste.

Los tardíos

Estos nacen en Julio y Agosto, incluso más tarde. No mudan completamente sus remeras; algunos no mudan ninguna remera durante el año de su nacimiento. Cada año, crío varios tardíos, especialmente machos: (1) Los tardíos nacen cuando ya se conocen las mejores parejas. (2) Se benefician del fuerte sol, para su desarrollo. (3) Es en esta época, que la influencia del atavismo se nota más: los pichones nacidos, son los más puros representantes de la raza. (4) Nunca conserve un tardío que no sea fuerte, con buenas plumas, y del tipo de sus buenos ancestros; esta es una regla a seguir estrictamente.

El cuidado de los tardíos

No soy de la misma opinión que algunos aficionados, que prodigan demasiados cuidados a los tardíos con la esperanza de hacerlos desarrollar más rápidamente; prefiero cuidarlos igual que a los otros pichones; si no se desarrollan normalmente, es porque no son bastante fuertes, y no me sirven. Estos tardíos, constituyen mi reserva: cuando pierdo uno de mis viajeros, enseguida tengo un sustituto. Además, los machos tardíos, mantienen a los otros machos a raya. No acoplo a las hembras tardías antes del mes de Mayo; de otro modo, sufrirían por la puesta precoz. No acoplarlos el primer año, favorece su desarrollo; no obstante, uno puede obtener buenos pichones de una pareja de tardíos, especialmente pichones rápidos, los cuales serán de gran ayuda para rejuvenecer la raza.

Entrenamiento de los tardíos

Algunos dicen que muchos tardíos se pierden; dicen que no son bastante inteligentes para volver rápidamente al palomar; en cuanto a esto, mi respuesta es que: el principal objetivo de mantener tardíos no es ganar premios con ellos al año siguiente. Se pondrían a entrenar a finales de Mayo, Junio, o Julio, mientras el tiempo sea bueno, de la misma manera que los pichones normales, aunque con más precauciones. Varias sueltas desde 5 kms, separadamente y en grupo; luego 10, 20, y 40 kms. Si vuelven de 100 kms el segundo año, estaría satisfecho con eso, y los detendría ahí. No olvide que muchos tardíos mudan dos remeras de cada ala al mismo tiempo, lo cual hace más difícil el entrenamiento. No espere maravillas hasta el tercer año.

Palomas en buena forma

Ciertas palomas están en buena forma al comienzo del año, y otras solo en los buenos días de Mayo; la mayoría de estas palomas ya han perdido la forma hacia el final de Mayo; no hacen nada más tras un comienzo brillante. Una paloma en buena forma se reconoce por los siguientes síntomas: (1) La caspa sobre el esternón desaparece; la piel es lustrosa y rosada, y es visible un punto rojo en el medio de la quilla, lo cual es un signo de perfecta circulación de la sangre ¡tenga cuidado con una piel grisácea o de tinte violeta! Las palomas están perdiendo su buena forma cuando reaparece la caspa. (2) Las patas están limpias y libres de excrementos, y son de un color rojo intenso. (3) Las membranas nasales y oculares están empolvadas de blanco. (4) El interior del pico está libre de mucosidad y no hay filamentos

entre la lengua y el paladar. (5) La hendidura del paladar está bien abierta; si no, la paloma no está en forma para marcar bien sobre distancias serias. (6) El ojo es bastante brillante, claro, vivo, y la pupila muy negra. (7) En el ala la muda sigue su curso normal: la más ligera indisposición repercute en la muda. (8) El plumaje es apretado, brillante, empolvado, y grasiento como aceitoso. (9) El cuerpo se siente firme al tacto, y da la sensación de un bloque compacto. (10) Las cagadas son duras y cubiertas de blanco; especialmente, el estado de los excrementos indica al buen aficionado como están sus palomas. Cuidado con las palomas que están todo el día erizadas como una bola, acurrucadas; que abren el pico constantemente, como si rumiaran algo; que agitan sus cabezas; y cuyas plumas están erizadas en lo alto del pico (la frente). No imagine que las palomas turbulentas, las cazadoras rabiosas, ganarán los primeros premios; coloque su confianza más bien en las que se mantienen en sus nidos defendiéndolos valientemente, y siempre están llevando algo a ellos para mejorarlos. Como ya dije, les gusta volar y permanecer en el aire más tiempo que las otras. Prefiero una paloma activa, una que tiene nervio, un aire vibrante. No examine sus palomas cuando están comiendo o alimentando a sus pichones; tienen una apariencia cansada en tales ocasiones, y tienen el habito de erizarse como una bola. Al regresar de un concurso, o al día siguiente, no espere verlas en su máximo. En orden a ver la condición de sus palomas, vaya al palomar pronto por la mañana y examine sus cagadas. Cuando alimentan a sus pichones, los padres pueden tener las narices sucias; en otra situación deben tenerlas bastante secas; una paloma en mala condición tendrá las narices y los ojos húmedos; este es el primer síntoma de enfermedad.

Consideraciones finales

(1) Evite acoplar dos palomas viajeras, pues un buen viajero siempre debe encontrar a su pareja al regreso. (2) Permita que el buen viajero tenga el mismo criadero que el año anterior; pues el más ligero cambio puede descorazonarlo. (3) No cambie de régimen continuamente, por así decirlo; adopte el sistema que más le guste, pero sígalo durante todo el año, pues nada es más perjudicial para el organismo que andar continuamente en el cambio. (4) Si tiene una paloma perezosa, retírela del palomar dos o tres días antes del enceste; póngala en un lugar donde no pueda ver otras palomas, incluso en el palomar de un amigo, y encéstela desde allí sin haber visto su propio palomar otra vez. (5) Si nota que alguna paloma no está bien, quítele los huevos o pichones; sepárela una quincena; púrguela; y reintégrela tras esas dos semanas de drástico tratamiento.

-

LA MUDA

Digamos al instante que la muda no es una enfermedad; bastante al contrario, las palomas enfermas tienen una mala muda. La muda no solo consiste en la renovación de las remeras, las timoneras, y las coberteras de las alas pecho cuello y cabeza; la muda del plumón no es menos importante; esta última toma lugar durante todo el año (plumón de verano e invierno). Un verdadero aficionado, mira cada mañana si hay un poco de plumón donde las palomas han estado reposando; esto es un signo de buena salud; una paloma que tiene una mala muda, tiene su futuro en peligro.

El proceso de la muda

Cuando las palomas incuban diez días la segunda postura, tiran la primera remera. La segunda remera cae cuando la primera ha crecido parcialmente, cuando están incubando por tercera vez; y así sucesivamente remera tras remera en cada incubación. Cuando cae la séptima remera, empieza la muda de las timoneras; las dos centrales caen primero, y luego en sucesión las adyacentes hasta la penúltima, que es la última en caer. Sin embargo, no es raro que muden dos remeras al mismo tiempo, cuando el tiempo es bueno; o que muden una remera con pichones muy pequeños. La muda se para cuando llevan incubando 15 días; la papilla comienza a formarse en ese momento; unos pocos días más tarde el plumaje estará completo, la muda se reanuda otra vez cuando los pichones tienen 10 días de edad. Esta detención de la muda, tiene su importancia para la paloma que se quiere viajar al final de la estación deportiva. Cuando la gran muda comienza (al caer la 5ª remera) es tiempo de parar las palomas buenas. La muda no toma lugar en todos los palomares al mismo tiempo; depende del mismo palomar, del calor, de la ventilación, de la comida, del esfuerzo realizado durante la estación deportiva y, en menor extensión, de la época de nacimiento de la paloma; hay tardíos que comienzan a mudar muy tarde en su vida (esta es la razón de que ciertos aficionados reserven a los tardíos para los concursos de fondo). No confíe en una paloma que ha tenido una mala muda; si una remera refleja el desgaste de un concurso, no es un gran peligro; mucho más grave es la malformación de una remera debido a una enfermedad; la paloma no estará en forma hasta que haya mudado la remera en cuestión el año siguiente. Es un buen plan eliminar todas las palomas que han tenido una mala muda. Condiciones necesarias para una buena muda: reposo, aire, luz, libertad, un palomar seco, regularidad, y baños. No obligue a sus palomas a volar cuando la muda está en su apogeo. Procure que las palomas tengan todo el beneficio de los rayos del sol, pues son regeneradores. Es un error imaginar que es necesario mantener a las palomas calientes; las que están en un palomar abierto al sureste tendrán la mejor muda; solo debe temerse a las fuertes corrientes de aire. Procure que durante los días lluviosos el agua no penetre donde las palomas están reposando; cuando llueve por la mañana, sáquelas fuera, es un buen baño. Ponga un baño a disposición de las palomas, cuando el tiempo no es muy frío, por la mañana para que estén secas por la tarde. No imagine que por sobrealimentarlas ayudará a la muda; las palomas bien racionadas tendrán la mejor muda. Tengo el habito de marcar las dos últimas remeras, así como las dos últimas timoneras; esto me capacita al final del año para saber si han finalizado su muda; es un mal síntoma para aquellas que no lo hacen, excepto por supuesto los tardíos.

Como ayudar la muda

No más crianza a partir del 15 de Agosto, solo déjelas incubar huevos artificiales. Si alguna pareja intenta criar impídaselo al instante. Si no obstante las palomas todavía tienen pichones pequeños, déjeselos hasta que tengan 10 días. Si la muda no sigue su curso normal, puede ayudarla de la manera siguiente: primer día a dieta completa; segundo día una purga (un poco de Linaza al mediodía); tercer día mitad linaza y mitad ración habitual; toda la semana siguiente 25% Linaza y 75% ración habitual. También ayuda dar Flor de Azufre durante 14 días (recubrir los granos con flor de azufre y dejarlos secar), una cucharada por 20 palomas. Cuide que el palomar este seco; esto se logra con una buena ventilación, pero sin corrientes de aire; las corrientes y la humedad, son muy perjudiciales durante la muda, y normalmente traen enfermedades. Evite la masificación; las adultas más los pichones nacidos durante el año, hacen que al final de Julio el número de palomas casi siempre sea demasiado para el espacio disponible; la falta de aire y de libertad, trae como resultado la indisposición y la enfermedad. De granos sanos; como ya he mencionado no debe olvidar la ración diaria de Linaza. Las palomas que viven en el campo tienen una buena muda; hacen abundante ejercicio; respiran aire puro; y encuentran toda clase de semillas pequeñas que ayudan al desarrollo del nuevo plumaje; estas semillas contienen muchas sustancias necesarias para la formación de las plumas; pueden comprarse a los campesinos que las sacan al cosechar y cernir los granos; deles un poco cada día (como postre). Los granos pueden ser recubiertos con una mezcla de lo siguiente: Flor de Azufre: 6.5 oz; Anís: 30 granos; Canela: 15 oz; Genciana: 45 oz; Quinina: 30 oz; Jengibre: 15 oz; Ruibarbo: 5 oz; Hinojo: 5 oz; Sulfato de hierro: 5 oz; Comino: 5 oz; Oxido de aluminio: 5 oz; (1 onza = 28 gramos). En orden a forzar la muda de la última remera, la paloma puede ponerse en una cesta, con paja húmeda en el fondo, dentro de la cocina (por el calor); sin embargo, recurra a esto solo en casos muy exepcionales; intente primero hacer que sus palomas muden normalmente siguiendo las indicaciones dadas en este capítulo y ¡nunca arranque una remera pensando que saldrá otra mejor!

-

LAS ENFERMEDADES

Por favor, no espere un tratado de medicina veterinaria; eso es el patrimonio de los especialistas, que han producido muchos medicamentos, a los cuales se les atribuye mucho éxito, aunque nada se dice de las desafortunadas palomas que los han recibido sin ningún efecto. La equivocación más grande de la mayoría de colombófilos es abusar de toda clase de drogas. Si fuéramos como los especialistas nos pasaríamos todo el día dándoles píldoras y elixires a las palomas. La mejor política, por supuesto, es prevenir la enfermedad; usted puede hacerlo en gran medida adoptando un buen régimen y siguiendo las reglas elementales de la higiene; primero de todo: cuide la SALUD de sus palomas; los requisitos son: buena ventilación, luz, granos sanos, ejercicio, y limpieza.

La limpieza

Hay aficionados que ganan muchos premios y sin embargo nunca limpian sus palomares; no le dan importancia a la higiene; solo se pueden esperar epidemias en los palomares abandonados. Yo encalo mi palomar dos veces al año: primero antes de acoplar, y segundo tras la estación deportiva (antes de la muda). A cada momento desinfecto el lugar, una tarea fácil con ayuda de un espray (un desinfectante comercial); cada día limpio el palomar mientras las palomas vuelan, retiro los excrementos, esto no toma más de 15 minutos; cada semana limpio el palomar profundamente con una espátula y una escoba, y noto cada vez que las palomas son más felices tras la limpieza; no hay objeción a esparcir una capa de arena sobre el suelo.

El bebedero

¡Agua pura renovada cada día! Limpie los bebederos todas las semanas con agua caliente y un cepillo. Hay algún aficionado que le añade alquitrán al agua, otro sulfato de hierro, etc, y lo encuentran beneficioso. Cuando está nevando, deje el bebedero en la casa durante la noche y llévelo al palomar por la mañana después de añadirle un poco de agua caliente para que no esté demasiado frío. Si quiere dar un elixir puesto en el mercado con gran publicidad por algún especialista, tenga cuidado de no dar demasiado; póngalo en el agua el domingo y lunes, y quizás el jueves. Cuando un concurso ha sido muy duro le doy a mis palomas, al día siguiente, agua de cebada (hervir un puñado en un cuarto litro).

La purga

Purge sus palomas como sigue: (1º) Antes de acoplar. (2º) Al comienzo de Junio. (3º) Después de la estación deportiva.

Píldora purgante

Estas píldora son muy eficaces, pero muy peligrosas; puede fabricarlas usted mismo como sigue: Áloe: 50 grs; Ruibarbo: 25 grs; Asafétida: 25 grs. Haga una píldora con la mezcla anterior usando un poco de miel; dé dos píldoras por la mañana, con una hora de intervalo entre ellas.

Elixir purgante

50 gramos de Sulfato de Magnesia o de Soda en un cuarto litro de agua para 20 palomas; la noche anterior retire el bebedero, y repóngalo por la mañana con el elixir; para hacerlas beber, deles un puñado de Linaza. Examine las palomas por la mañana para ver si tienen el buche vacío; si no, la paloma no está bien; dele un poco de bicarbonato sódico. Otro elixir excelente: hierva durante 15 minutos una ramita de Ruda (Ruta Graveolens) en un cuarto litro de agua; es un buen remedio para la purga otoñal. Para que el efecto de la purga sea completo, se precede de un tratamiento de Linaza: la semana anterior, y la posterior a la purga, se dobla la cantidad normal de Linaza. Tras estos 14 días previos a los acoplamientos, se da la siguiente bebida por una semana: Raíz de Genciana: 1.5 oz; Raíz de Acedera: 1.5 oz; Raíz de Fresa: 0.75 oz; Raíz de Achicoria silvestre: 0.75 oz; Yoduro de Potasio: 30 granos; Agua: 6 pints (3.45 litros); hierva 15 minutos y deje enfriar; (1 onza = 28 gramos) (8 pints = 4.6 litros).

Palomas enfermas

A pesar de todas las precauciones, algunas veces las palomas se indisponen, e incluso se enferman.

Medidas a tomar

Tan pronto note que una paloma pierde el apetito y se acurruca, déjela sin comer 24 horas y luego púrguela; este ayuno más la purga curará la mayoría de las indisposiciones. Conozco a campeones que no usan otro método que el siguiente con sus palomas enfermas: la ponen aparte en una jaula con unas pocas tablas para protegerla de la lluvia, y solo le dan de comer cebada trigo y linaza; si la paloma no se cura sola, prefieren que muera; un sistema drástico.

Envenenamiento

Aísle la paloma; dele una píldora purgante después de haber lavado el buche con leche tibia; inyecte la leche en el buche con una jeringa, luego manténgala cabeza abajo y masajée el buche para que salga la leche; repita dos o tres veces; dele leche para beber.

Heridas

Estas se curan muy rápidamente. Si la paloma tiene el buche abierto, cósalo de tal forma que las plumas no toquen la herida, para ello córtelas alrededor del lugar. No les dé de beber, y de comer solo unos cuantos Feveroles que han estado en remojo 12 horas.

-

CONSEJOS DIVERSOS

Deles bastante libertad a sus palomas para que sus huevos sean fértiles. Existe el riesgo de huevos estériles cuando las palomas están continuamente encerradas; unas a otras se impiden acoplarse. Para que puedan formar buenos huevos deles sustancias calcáreas, una buena fórmula es la siguiente: Cal: 2.25 lbs; Arcilla: 2 lbs; Cañamón: 1 lb; Anís: 3.5 oz; Cáscara huevo: 1 lb; Sal: 3.5 oz. (1 onza = 28 gramos) (1 libra = 454 gramos). Añada agua hasta formar una masa espesa y forme pequeños ladrillos de ½ libra; séquelos en el horno, y ponga uno en el palomar; les encantará. No se preocupe por las palomas que tienen la punta de la lengua azul, ni por las que tienen las membranas rosadas. Es una gran equivocación alimentar las palomas demasiado tarde, la ultima comida se daría sobre las 5 pm. Si una paloma regresa muy cansada, dele un baño en agua tibia, y póngala en la cocina hasta que se seque; dele de comer trigo, arroz, linaza, y migas de pan con leche. No permita que una paloma se apropie del criadero de otra que está viajando. No asuste las palomas cuando regresan del concurso; no las deje beber agua muy fría, esto podría causar un enfriamiento. Para que descansen durante el invierno, separe los machos de las hembras, de tal forma que pueda soltarlos a ambos por separado; yo no dejo encerradas la mitad de las palomas durante uno o dos meses. Deles baños en verano e invierno; el lunes y el jueves por la mañana durante la estación deportiva; a mediodía en el invierno; son buenos para los machos y las hembras, son revitalizantes. La lechuga, los berros, la col, etc, son buenas para las palomas; son ricas en vitaminas y minerales. Para saber cómo está su paloma, póngala en una cesta una hora antes de llevarla al Club, de tal forma que pueda ver el palomar. Si la paloma está bien, permanecerá firme después de ese tiempo; si se afloja, algo no anda bien. Algunos aficionados veteranos, limpian las patas de sus palomas con aceite de oliva, antes de encestarlas.

-

ENERO
Separe los sexos.
Suéltelos por turnos antes de comer.
Una comida al día es suficiente.
Vigile la muda del plumón.

FEBRERO
Prepare las palomas para el acoplamiento.
Deles una purga y un tónico.
Cambie la comida de reposo a cría poco a poco.
Limpie, desinfecte, encale.

MARZO
Acople las palomas.
Déjelas solas.
Deles ramitas para el nido.
Anille los pichones a tiempo.

ABRIL
No toque más los pichones después de anillarlos.
Destételos a los 25 días.
Dos comidas al día.
Vigile la caída de la primera remera.

MAYO
Cambie poco a poco a mezcla de viaje.
Dos o tres comidas al día.
No dé semillas estimulantes.

JUNIO
Empiezan los concursos de fondo.
Entrene a los pichones.
Deles un poco de cañamón.

JULIO
El mes de las campeonas.
Deles más semillas estimulantes.
No les dé agua fría.

AGOSTO
Pocos concursos, reposo para las campeonas.
Comienza la muda.
No viaje palomas que están mudando.
Cambie poco a poco a comida de muda.
No olvide la Linaza.

SEPTIEMBRE
Pare la crianza.
Solo viaje las palomas que no le gustan mucho.
Elimine las adultas y pichones que menos rinden.
Marque las últimas plumas a ser mudadas.
Desinfecte el palomar.
Cierre los criaderos.
Purge las palomas.
Dos comidas por día.
Cuidado con el envenenamiento en el campo.
Un poco de flor de azufre ayuda la muda.
No olvide los baños.
Deles trigo duro y nuevo.

OCTUBRE
Vigile el progreso de la muda.
Evite la humedad.
Dos comidas al día.

NOVIEMBRE
Cambie poco a poco a la comida de reposo.
Una comida al día.
Cuidado con la neblina.
Visite las exposiciones.
Busque alguna paloma nueva para mejorar su raza.
La muda continua, especialmente la del plumón.
Menos alimento.

DICIEMBRE
No deje que los bebederos se congelen.
Aproveche para hacer cualquier modificación en el palomar.

-